



Neumoflor

Suspensión inyectable estéril

Forma farmacéutica

Antibiótico – Antiinflamatorio – Analgésico – Antipirético

Composición

Florfenicol 30,0 g, Diclofenac 3,75 g, Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones*

Esta indicado para el tratamiento de afecciones causadas por gérmenes sensibles al florfenicol. Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. Diarrea de los terneros. Pietín. La incorporación de Diclofenac en la formulación lo convierte en un potente agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

Especie de destino

Bobinos, porcinos.

Dosis y vía de administración

La dosis a aplicar es de 1 ml. de Neumoflor cada 15 kg de peso vivo. Esta dosificación corresponde a la aplicación de 20 mg de florfenicol y 2,5 mg de diclofenac por kg de peso vivo. Se recomienda repetir el tratamiento a las 48 horas de la primer aplicación. Esta dosis es orientativa y puede modificarse según criterio del profesional actuante. Vías de administración intramuscular, preferentemente en la tabla del cuello.

Contraindicaciones, precauciones y advertencias

No administrar en hembras en gestación y en machos que se utilicen con fines reproductivos. No utilizar en animales hipersensibles al principio activo y/o excipientes No aplicar en pacientes con insuficiencia hepática, renal y úlceras gastrointestinales. En bovinos no aplicar más de 20 ml cada punto de inyección. En porcinos no aplicar más de 10 ml cada punto de inyección.



Restricciones de uso

No utilizar en vacas lecheras en producción. Deben transcurrir 28 días entre el último día del tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano.

Presentación

100 ml.