Ceftion Aguda

Antibiótico, antimastitico

CALIER - All rights reserved



Fórmula farmacéutica
Antibiótico intramamario para el tratamiento de mastitis ambientales.

Composición
Ceftiofur clorhidrato: 100 mg. Cefalexina monohidrato: 100 mg. Prednisolona 5 mg. Vehículo c. s.p. 5 g.

Indicaciones
Tratamiento de mastitis producidas por microorganismos sensibles a la cefalexina, ceftiofur o su combinación, durante la lactancia.
Agentes etiológicos susceptibles: Ceftiofur: Staphylococcus aureus; Streptococcus dysgalactiae; Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli. Cefalexina: Staphylococcus aureus; Streptococcus agalactiae; Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis: Streptococcus spp.; Corynebacterium spp.; Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabiles.

Contraindicaciones y advertencias
No administrar en animales previamente reconocidos como hipersensibles a algunos de los principios activos y/o excipientes del producto. No exceder las dosis propuestas.
Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

Dosificación
Aplicar una jeringa por cuarto mamario cada 24 horas. Se recomienda un mínimo de dos dosis. Forma de aplicación: Intramamaria.
Previamente a la aplicación, extraer en lo posible la totalidad de la leche en el cuarto a tratar, lavar y desinfectar, luego secar cuidadosamente.
Introducir el contenido completo de una jeringa a través del conducto galactóforo. A fin de favorecer la difusión del producto, es conveniente dar un ligero masaje ascendente luego de la administración.

Especie de destino
Bovino.

Restricciones de uso
Tiempo de retiro pre-faena: 4 días.
Tiempo de retiro pre-ordeñe: 48 horas.
La intoxicación con este producto no puede producirse por manipulación del mismo, únicamente por ingestión accidental.
En este caso se recomienda llamar inmediatamente al médico.
No existe antídoto, aplicar tratamiento sintomático.

Conservasión
Conservar al abrigo de la luz entre 8 y 25 °C.

Presentación
Caja por 12 jeringas de 5g.

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.
Maturin 2745 (C1416CTM) - CABA - Buenos Aires - Argentina.
Tel.: (011) 4582-8668 - calier@calier.com.ar