ANTIBIÓTICO

Biomacrotil 200

Antimicrobiano. Antimicoplasmico.

CALIER - All rights reserved

Forma farmacéutica:
Solución antibiótica inyectable a base de Tilosina.

Composición
Tilosina 20 g. Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones
Bovinos: Complejo respiratorio bovino, generalmente asociado con Pasteurella multocida y Corynebacterium pyogenes, neumonía, bronquitis, difteria, metritis. Porcinos: Artritis, neumonía, Disentería porcina. Perros: Infecciones respiratorias (bronquitis, traqueobronquitis, traqueítis, laringitis, tonsilitis, neumonía); leptospirosis; otitis. Gatos: Enfermedades respiratorias. Indicado en general en infecciones producidas o complicadas por los siguientes gérmenes sensibles a la Tilosina: Mycoplasmas spp, Espiroquetas: Serpulina hyodisenteriae, Leptospira spp; Chiamydia spp; bacterias Gram (+): Staphylococcus spp, Streptoccocus spp, Erysipelotrixrhusiopathiae, Corynebacterium pyogenes,Clostridium spp; bacterias Gram (-): Fusobacterium necrophorum; Pasteurella spp, Bordetella bronchiseptica

Especies de destino
Bovinos, porcinos y aves.

Dosificación y vía de administración
Bovino: 0,5 ml de BIOMACROTIL 200/10 kg p.v., cada 24 horas durante 3-5 días. Cuando se administre más de 10 ml, repartir la dosis en distintos puntos de inoculación. Porcino: 0,5 ml de BIOMACROTIL 200/10kg p.v., cada 12 horas durante 3 días. Cuando se administre más de 5 ml, repartir la dosis en distintos puntos de inoculación. Canino y felino: 0,5 ml de BIOMACROTIL 200/10 kg p.v., cada 24 horas durante 3-5 días.

Aplicación
Administrar por vía intramuscular.

Contraindicaciones
No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas.
Es incompatible con Estreptomicina, Hidrocortisona, sulfamidas y tetraciclínas.

Tiempo de retiro
Carne: 21 días. Leche: 4 días.

Presentación
Frasco 250ml.

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.
Maturin 2745 (C1416CTM) - CABA - Buenos Aires - Argentina.
Tel.: (011) 4582-8668 - calier@calier.com.ar

calier.com.ar