



TILCOMINA ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Antibiótico de amplio espectro de uso oral para aves y cerdos.

COMPOSICIÓN:

Tilmicosina base 25 g. Bromhexina Hcl 0,42 g. Vehículos y excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles al principio activo Tilmicosina, principalmente procesos infecciosos respiratorios.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía oral en el agua de bebida. Aves, clima frío: diluir 120 ml en 100 l de agua. Clima caluroso diluir 120 ml en 100 l de agua. Dosis estimada: Tilmicosina: 30 mg/kg; Bromhexina: 0,5 mg/kg. Duración 3 a 5 días. Intervalo entre dosis: 24 horas. Cerdos: Diluir 80 ml del producto en 100 l de agua. Dosis estimada: Tilmicosina: 20 mg/kg; Bromhexina: 0,33 mg/kg. Duración 3 a 5 días. Intervalo entre dosis: 24 hs.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en aves hipersensibles a alguno de los principios activos. No utilizar en aves productoras de huevos destinados al consumo humano. No administrar conjuntamente con antibióticos B-lactámicos. No administrar en equinos. Producto muy tóxico para esta especie y otros solípedos. El producto debe ser preparado diariamente con agua potable limpia. Se recomienda suspender el acceso al agua de bebida durante un lapso de tiempo previo a la administración, para asegurar el consumo rápido y total del agua medicada. Si los animales no están en condiciones de ingerir suficiente cantidad de agua por encontrarse debilitados o enfermos, se recomienda la administración previa de tratamientos inyectables. Se recomienda utilizar guantes de látex o goma para manipular el producto (puede ser irritante para la piel). Utilizar asimismo lentes protectores para evitar salpicaduras en los ojos. Lavar las manos luego de su manipulación. Atención: la toxicidad en el hombre no se produce por la manipulación del producto, únicamente por inyección o ingestión accidental. En este caso llamar inmediatamente al médico. No existe antídoto específico.

TIEMPO DE RETIRO:

Aves: 12 días. Porcinos: 14 días.

PRESENTACIÓN:

Botella de 1 lt.