ANTIBIÓTICO

Linalten 300

Solución inyectable estéril



Composición
Lincomicina clorhidrato 30 g., Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Lincomicina está indicada en infecciones por gérmenes grampositivos del tracto respiratorio, tracto genito-urinario, piel y tejidos blandos, huesos y articulaciones.
En el caso particular de los bovinos esta especialmente indicada para el tratamiento de mastitis causadas por Staphylococcus spp. y Streptococcus spp. En porcinos está especialmente indicada para el tratamiento de Neumonías causadas por Mycoplasma spp.; artritis causadas por Mycoplasma spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. y Erysipelothrix spp. y disentería porcina causada por Serpulina (Treponema) hyodysenteriae.

Especie de destino
Bovinos, porcinos, caninos y felinos.

Dosis y vía de administración
Administrar por vía intramuscular (IM).
Porcinos: 15 mg/kg (1 ml cada 20 kg de peso vivo).
Bovinos: 5 a 10 mg/kg (1 a 2 ml cada 60 kg de peso vivo).
Caninos y felinos: 15 mg/kg (1 ml cada 20 kg de peso vivo). Repetir cada 24 hs.
Duración del tratamiento: Porcinos, caninos y felinos: 3 a 7 días, según la severidad del cuadro clínico y el criterio del profesional actuante.
Bovinos: 3 a 4 días, según la severidad del cuadro clínico y el criterio del profesional actuante.

Contraindicaciones y advertencias
No administrar a equinos, conejos, hámsters, cobayos debido a los serios efectos gastrointestinales que pueden presentarse, incluida la muerte. No administrar en animales hipersensibles al principio activo.

Efectos colaterales
Las inyecciones intramusculares pueden inducir dolor en el sitio de aplicación. Los efectos adversos comunicados en caninos y felinos incluyen gastroenteritis (emesis, deposiciones blandas, y pocas veces diarreas sanguinolentas. Los cerdos y los bovinos también pueden experimentar anormalidades gastrointestinales mientras reciben la medicación.

Restricciones de uso
Deben transcurrir 14 días entre el último día del tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano. Deben transcurrir 48 horas entre el último día de tratamiento y el destino de la leche para consumo humano. El producto no esta indicado para su uso en Medicina Humana.

Presentación
Frasco por 100 ml.

CALIER - All rights reserved

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.
Maturin 2745 (C1416CTM) - CABA - Buenos Aires - Argentina.
Tel.: (011) 4582-8668 - calier@calier.com.ar

calier.com.ar