



ESPES

Antibiótico contra bacterias
Gram + y Gram -

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable

Composición

Bencilpenicilina (Procaina) 20.000.000 U.I.
(equivalente a 20 g)
Dihidroestreptomicina (sulfato) 20 g



Indicaciones*

Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias y/o secundarias a infecciones víricas, causadas por gérmenes sensibles a la asociación, tales como:

Bóvidos, óvidos: Abscesos Cutáneos, Actinomicosis, Afecciones Podales, Artritis, Carbunco Bacteriano, Leptospirosis, Mamitis, Metritis, Neumonía y Bronconeumonía.

Cerdos: Artritis, Aborto (por Brucellas, Leptospiras y otros gérmenes sensibles), Leptospiras, Mal Rojo, Neumonía y Bronconeumonía, Síndrome MMA.

Équidos: Metritis, Neumonía y Bronconeumonía, Paperas.

Perros y gatos: Artritis, Infecciones Genitourinarias, Neumonía, Traqueobronquitis, Peritonitis.

Posología*

Vía intramuscular.

Bóvidos, óvidos, cerdos y équidos: 6000 - 12000 UI de Bencilpenicilina procaina + 6 - 12 mg de dihidroestreptomicina / kg p.v. y día (equivalentes a 0,03 - 0,06 ml de ESPES / kg p.v.)

Perros y gatos: 1000 - 20000 UI de Bencilpenicilina procaina + 10 - 20 mg de dihidroestreptomicina / kg p.v. y día (equivalentes a 0,05 - 0,1 ml de ESPES / kg p.v.). Continuar el tratamiento hasta 1 ó 2 días después de la remisión de los síntomas.

Contraindicaciones

No administrar en animales con hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos. Animales con insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o con lesiones cocleovestibulares. Animales con edad inferior a un mes. Conejos, cobayas y hámsters.

Tiempo de espera*

Carne: 30 días.

Leche: 3 días. No permitido su uso en équidos cuya carne se destine para el consumo humano.

Propiedades farmacológicas

Antibiótico betalactámico que se engloba dentro de las penicilinas naturales del grupo G, de administración exclusivamente parenteral y espectro reducido. Posee una acción fundamentalmente bactericida contra la mayoría de bacterias Gram + y contra un número limitado de bacterias Gram - (sobretudo en medio urinario), así como contra ciertas espiroquetas y actinomicetos.

Producto de origen

España

Presentación

250 ml

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.