



# ESPES 5 MILLONES

## FORMA FARMACÉUTICA:

Antimicrobiano - Antiinflamatorio  
- Analgésico - Antipirético.

## COMPOSICIÓN:

Cada frasco con polvo contiene: Penicilina G Benzatínica 2.500.000 U.I. (1,98 g)  
Penicilina G Sódica 2.500.000 U.I. (1,56 g),  
Estreptomicina 2 g.

Cada frasco con diluyente contiene:  
Diclofenac 1,25 g, Agua c.s.p. 20 ml.

## INDICACIONES:

Se trata de una formulación antimicrobiana de amplio espectro destinada a combatir infecciones mixtas causadas por bacterias gram positivas, aerobias y anaerobias, y gram negativas. Además cuenta con el accionar de un potente agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Presenta efectividad en el control de afecciones causadas por las siguientes bacterias: Streptococcus penicilina lábiles; Staphylococcus penicilina lábiles; Corynebacterium pyogenes; Clostridium spp.; Erysipelothrix rhusiopathiae; Actinomyces ovis; Leptospira spp.; Pasteurella spp.; Escherichia coli y Campylobacter fetus.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Diluya en forma aséptica el polvo mezcla de antimicrobianos con el diluyente del segundo frasco. Agitar antes de usar. Administrar 1 ml cada 25 kg de peso vivo.

Esta dosis corresponde a la aplicación de:

- 10.000 U.I. de penicilina por kg de peso vivo.
- 4 mg de estreptomina por kg de peso vivo.
- 2,5 mg de diclofenac por kg de peso vivo.

Repetir cada 24 a 48 horas. Tres aplicaciones. La duración del tratamiento será fijada de acuerdo a la evolución del paciente. De no remitir los signos replantear el diagnóstico y su tratamiento. Una vez reconstituido el producto debe conservarse en heladera, siendo la duración máxima de 48 horas.

Se aplica por vía intramuscular profunda.

## CONTRAINDICACIONES:

Evite administrar en animales con historia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a los principios activos del producto. No administrar a animales con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o úlceras gastrointestinales.

Utilizar jeringa y aguja estériles. Cerciórese al introducir la aguja y previo al inyectar el antibiótico, que la misma no esté en un vaso sanguíneo. A la dosis recomendada es bien tolerado. Las reacciones colaterales que pueden presentarse están relacionadas con el tracto gastrointestinal y pueden ser estomatitis, anorexia, constipación o diarrea y dispepsia.

## TIEMPO DE ESPERA:

No destinar animales a faena para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano o industrialización.

## CONSERVACIÓN:

Conservar entre 15°C y 30°C y al abrigo de la luz solar directa.

## PRESENTACIÓN:

6 frascos de polvo, 6 frascos con 20 ml de diluyente.

