



Biomacrotil PS

Tilosina Tartrato 100%

Forma farmacéutica

Antibiótico de amplio espectro. Polvo para uso oral.

Composición

Cada 100 g. de producto contiene: Tilosina tartrato = 100 g.; Excipientes c.s.p.

Indicaciones

Antibiótico bacteriostático a dosis usuales y bactericida a dosis altas, indicado para el tratamiento de procesos infecciones causados por gérmenes sensibles a la Tilosina. Aves: enfermedad crónica respiratoria; sinusitis infecciosa. Porcinos: rinitis atrófica; neumonía enzoótica; disentería porcina; enteropatía proliferativa porcina; ileítis.

Especies de destino

Aves y porcinos.

Dosis y vía de administración

Reproductoras, aves de reemplazo, pollos parrilleros: Disolver 500 mg de Biomacrotil PS por cada litro de agua de bebida. Administrar cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Pavos: Disolver 600 mg de Biomacrotil PS por cada litro de agua de bebida. Administrar cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Control de Micoplasmosis aviar: Disolver 500 mg de Biomacrotil PS por cada litro de agua de bebida los tres primeros días de vida y durante las 24 horas siguientes a la administración de una vacuna a virus vivo. Repetir entre los 21-28 días de vida.


Porcinos: 250mg de Biomacrotil PS, por cada litro de agua de bebida. Administrar cada 24hs durante 3 a 5 días.

Es conveniente efectuar una primera dilución del producto en 4 a 5 litros de agua, agitando hasta lograr su disolución. Luego agregar esta solución al agua de bebida. La dilución debe ser preparada diariamente y utilizada dentro de las 24 horas de preparada. El agua medicada debe constituir la única fuente de agua para consumo.

Se deberán efectuar los ajustes necesarios si el consumo de agua se ve modificado por la temperatura ambiente.

Contraindicaciones

No administrar conjuntamente con Cloranfenicol, Florfenicol, Lincosamidas y otros antibióticos Macrólidos.



Tiempo de retiro

Pollos parrilleros, gallinas y pavos - 5 días. Porcinos: 14 días.

No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano. No administrar en otras especies.

Conservación

No exponer a la luz solar directa. Conservar en lugar seco entre 4° y 30° C.

Presentación

Cuñete de 15 kg.