ANTIBIÓTICO

# LINALTEN LACTANCIA

Solución Antibiótica Intramamaria para vacas en lactancia

CALIER - All rights reserved

## Fórmula
Lincomicina (clorhidrato) 3,3g; Neomicina (sulfato) 1,0g; Prednisolona 0,2g; Excipientes csp 100ml.

## Indicaciones
Antimicrobianos - Antibióticos - Lincosamidas - Aminoglucósidos - Tratamiento de la inflamación - Antiinflamatorios esteroides. Asociación de 2 antibióticos y un corticoide, aconsejado en el tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas en vacas y vaquillonas en lactancia, causadas por bacterias sensibles a la Lincomicina y Neomicina o su combinación incluidas aquellas que producen beta-lactamasas.

## Especies de destino
Bovinos en lactancia y vaquillonas.

## Dosificación
Extraer en lo posible la totalidad de la leche en el cuarto a tratar, limpiar y desinfectar el pezón antes de la administración. Introducir el contenido completo de una jeringa a través del conducto galactóforo en cada cuarto afectado. A fin de favorecer la difusión del producto, es conveniente dar un ligero masaje ascendente luego de la administración.
Administrar una jeringa por cuarto mamario afectado cada 24 horas. Se recomienda un mínimo de 2 aplicaciones según criterio del Médico Veterinario actuante puede repetirse cada 12 o 24 horas. Según criterio profesional, el tratamiento puede prolongarse.

## Aplicación
Intramamaria

## Contraindicaciones
No administrar en animales con antecedentes de sensibilidad a los principios activos. Evitar el contacto del producto con la piel del operador. Si se llegara a producir contacto lavar la zona con abundante agua. En caso de Hipersensibilidad, aplicar tratamiento sintomático.

## Precauciones
La Lincomicina está contraindicada en los pacientes que hayan mostrado ser alérgicos a este antibiótico o a la Clindamicina. No se recomienda la administración de Lincomicina a pacientes con historia de alteraciones gastrointestinales, en particular con historia de colitis.




## Período de retiro
La leche de los animales tratados no debe destinarse para consumo humano antes de las 84 hs del último tratamiento.

## Conservación
Conservar en su envase original, en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa, entre 15-30ºC.

## Presentación
Envase de 24 y 120 jeringas por 10 ml.

**LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.**
Maturin 2745 (C1416CTM) - CABA - Buenos Aires - Argentina.
Tel.: (011) 4582-8668 - calier@calier.com.ar

calier.com.ar