ANTIMASTÍTICO

Cloxacum Sell

Sello interno con color

CALIER - All rights reserved

Composición
Cada 100 g contiene:
Subnitrato de bismuto 61,3 g, Óxido de zinc 5 g, Excipientes c.s.p 100 g.

Indicaciones
El producto está indicado en vacas lecheras en la prevenc1on de nuevas infecciones intramamarias a lo largo del período seco. Actúa creando una barrera dentro del canal del pezón, evitando así el ingreso de microorganismos a través de dicha vía. La acción del producto es netamente mecánica, ya que no contiene antibióticos ni quimioterápicos.

Vía de administración
Intramamaria.

Dosificación
Aplicación preventiva: Aplicar en forma intramamaria una jeringa en cada cuarto inmediatamente después del último ordeñe en la lactación (en período seco).Administrarel contenido de una jeringa (4 g) en el canal de cada pezón de cada cuarto mamario inmediatamente después de la aplicación de un antibiótico intramamario de secado. Se recomienda una buena limpieza y desinfección de cada pezón previo a su administración. No masajear el pezón ni la ubre después de su aplicación. Es aconsejable desinfectar apropiadamente el pezón luego de su administración. Deben tratarse todos los pezones de cada ubre. El producto permanece en el canal del pezón lo que dura el período seco.

Contraindicaciones
La utilización de este producto está limitada al momento de secado. No utilizar en vacas con sospecha o confirmación de infección intramamaria.

Especie de destino
Bovino.

Precauciones especiales para su utilización
Se recomienda una buena limpieza y desinfección de cada pezón previo a su administración. No masajear el pezón ni la ubre después de su aplicación. Es aconsejable desinfectar apropiadamente el pezón luego de su administración. Se aconseja la aplicación de un antibiótico para secado previo a la administración del producto. No remover el producto por la acción de la máquina ordeñadora. Se recomienda despuntar los pezones exhaustivamente (10 a 12 chorros de cada cuarto) antes del primer ordeño del ciclo de lactancia, con el fin de evitar la acumulación del producto en las máquinas ordeñadoras.Al despunte su colorturquesa flúor nos va a permitir comprobar la persistencia del producto durante todo el periodo seco. Si el producto es administrado accidentalmente a una vaca lactante, se podrá eliminar despuntando el pezón manualmente.

Periodo de retiro
Carne: 0 días; Leche: 0 días.

Conservasión
Consérvese en su envase original, en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa, entre 15 ºC y 25 ºC.

Presentación
Caja de 24 y 120 jeringas de 4 g.

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.
Maturin 2745 (C1416CTM) - CABA - Buenos Aires - Argentina.
Tel.: (011) 4582-8668 - calier@calier.com.ar

calier.com.ar