



ESPIRAGEN

COMPOSICIÓN:

Espiramicina adipato 5,5 g,
Gentamicina sulfato 7,2 g, Flunixin
meglumina 2,5 g, Excipientes c.s.p.
100 ml.

ESPECIES INDICADAS: Bovinos.



INDICACIONES: Espiragen solución inyectable aporta la acción antimicrobiana de la Espiramicina y Gentamicina, la actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética del Flunixin Meglumina. La actividad combinada de los tres principios activos favorece un rápido y efectivo control de los cuadros infecciosos, a la vez que se reducen la inflamación, dolor e hipertermia asociados. Espiragen está indicado para el tratamiento de infecciones de etiología bacteriana producidas por gérmenes sensibles a la espiramicina y/o gentamicina en Bovinos, por ejemplo: Mastitis agudas y crónicas, endometritis y metritis, piétin, lesiones dérmicas, neumonías de distinta etiología, queratoconjuntivitis, gastroenteritis, onfaloflebitis, poliartritis, preventivo de infecciones post operatorias en cirugía mayor o menor. Afecciones de cavidad bucal y faríngea.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía de administración: Intramuscular o endovenosa lenta. 1 ml cada 12 kg de peso cada 24 hs por vía intramuscular o intravenosa lenta. Esto es equivalente aproximadamente a 18.400 UI /kg de peso vivo de Espiramicina adipato, 6,0 mg/ kg de peso vivo de Gentamicina sulfato y 2,1 mg/kg de Flunixin Meglumina. Se recomienda un mínimo de dos dosis. La duración del tratamiento dependerá de la evolución del cuadro clínico y del criterio del profesional Veterinario.

CONTRAINDICACIONES DE USO: No administrar en animales previamente reconocidos como hipersensibles a alguno de los principios activos y/o excipientes del producto. No usar en casos de daño renal o hepáticos severos, hipotensión, deshidratación, insuficiencia cardíaca ni en animales con lesiones de mucosa gastrointestinal. No utilizar conjuntamente con fármacos potencialmente nefrotóxicos: bloqueantes neuromusculares, diuréticos, Cefalotina, Cefaloridina, Anfotericina B o Heparina. La inyección intraarterial debe ser evitada (ya que produce ataxia, incoordinación, hiperventilación y debilidad muscular).

PRECAUCIONES DE USO: Luego de administrar por primera vez el producto a un animal, controlar la aparición de síntomas de reacción alérgica. En caso positivo tratar sintomáticamente. Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo. La inyección Intramuscular puede provocar dolor y/o induración pasajeros. La inyección endovenosa debe realizarse en forma lenta.

RESTRICCIONES DE USO: Tiempo de retiro pre-faena: 25 días. Tiempo de retiro en leche: 96 horas.

CONSERVACIÓN: Entre 15°C y 30°C, al resguardo de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml