



Calcio-Calier Forte

Solución inyectable estéril

Composición

Borogluconato de Calcio (aporta 4,6 g de Calcio) 55,28 g., Cloruro de Magnesio Hexahidratado (aporta 0,768 g de Magnesio) 6,43 g., Hipofosfito de Magnesio Hexahidratado (aporta 0,031g de Magnesio y 0,08 g de Fosforo) 0,338 g., Excipientes C.S.P. 100 mL.

Indicaciones

Suplemento preventivo terapéutico - Minerales. Hipocalcemia aguda, Incluyendo la paresia puerperal de la vaca.

Especies

Bovinos.

Dosis

Administrar 7,5 mg -22,5 mg de Calcio por kg de p.v. (equivalente a 0,16 ml – 0,49 ml de Calcio Calier Forte/kg de p.v.), según la gravedad del proceso.

Contraindicaciones

No administrar a animales hiperexcitados, ya que puede ocurrir muerte repentina.

Incompatibilidades e interacciones

No administrar con tetraciclinas, sulfato de magnesio, bicarbonato sódico y sulfato de estreptomicina y de dihidroestreptomicina. No administrar junto con glucósidos cardiotónicos.

Efectos secundarios

La inyección subcutánea puede causar necrosis en el punto de inyección. Se puede producir bradicardia e incluso paro cardíaco si la inyección intravenosa es rápida.

Precauciones especiales para su utilización

La inyección intravenosa debe realizarse muy lentamente (6-10 minutos), templando previamente la solución. Simultáneamente a la administración intravenosa, se debe realizar una auscultación cardíaca; si se desarrollan disritmias o bradicardias graves, debe suspenderse la administración hasta que el latido del corazón vuelva a la normalidad.

Cuando se administra en vía SC, se repartirá en varios puntos de inyección (un máximo de 25 ml por punto de aplicación).



Sobredosificación

No exceder la dosis recomendada. En casos de sobredosis, puede manifestarse arritmia cardíaca, bradicardia y coma. Puede provocarse un bloqueo cardíaco irreversible.

Período de retiro

Pre-faena: 0 días. Pre-ordeño: 0 horas.

Conservación

Conservar entre 15-25°C al abrigo de la luz solar directa.