



DEXAMAN

FORMA FARMACÉUTICA:

Antiinflamatorio, diurético, corticoide.

COMPOSICIÓN:

Dexametasona Fosfato Sódico 60 mg.
Triclormetiazida 1 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

ESPECIES:

Bovinos, equinos, ovinos.

INDICACIONES:

Bovinos y ovinos: Congestión y edema de ubre. Persistencia del edema de lactación. Edema y congestión pulmonar. Edema de manifestaciones alérgicas. Infiltración edematosa de heridas quirúrgicas.

Equinos: Congestión y edema de origen diverso. Edema de declive. Edema de manifestaciones alérgicas. Infiltración edematosa de heridas quirúrgicas.

DOSIFICACIÓN:

Administrar por vía intramuscular.

La dosis general es de 0,5 ml cada 20 kg de peso vivo. Esta dosis puede repetirse a las 24 horas, dependiendo de la evolución del caso clínico y del criterio del profesional actuante. En edema de ubre, administrar 10 a 20 ml, repitiendo el tratamiento a las 24 horas, en caso de ser necesario.

CONTRAINDICACIONES:

No debe utilizarse en casos de glomerulonefritis aguda e insuficiencia renal, y en pacientes con cirrosis hepática grave. Tampoco se recomienda la administración en casos de pancreatitis y diabetes mellitus. No administrar en hembras preñadas.

Como todos los diuréticos mayores, tratamientos prolongados o sobredosis pueden producir alteraciones del equilibrio electrolítico. Se aconseja no sobrepasar las dosis indicadas y no aplicar tratamientos que superen en duración a los 3 días, esperando una semana si se desea repetir. No es conveniente su administración en enfermedades infecciosas bacterianas, virales y micóticas y sarna demodéctica.

A la dosis recomendada es bien tolerado.

No destinar animales a faena ni destinar la leche de los mismos a consumo humano hasta 72 horas después de finalizado el tratamiento.

No derramar el contenido de los frascos o desechar éstos en cauces de agua, lagunas, etc.

APLICACIÓN:

Inyectable.

PRESENTACIÓN:

Frasco ampolla conteniendo 30 ml.

