



PLUSELAR 0,6

Pluselar es un dispositivo intravaginal impregnado con Progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada dispositivo intravaginal contiene: Progesterona (4-pregnano 3,20-diona) micronizada 0,6 g. Silicona Inerte c.s.p.un dispositivo intravaginal.

INDICACIONES:

- Control del ciclo estral en vaquillonas/novillas y vacas.
- Tratamiento del anestro posparto.
- Acortamiento del período parto concepción.

El producto se aplicará de acuerdo a los siguientes programas:

INDICACIÓN	DÍA 0	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9	DÍA 10
Anestro	ID+BE2			RD+eCG+PG	BE1	IA
Celo silencioso	ID+BE2	PG	RD		IA	
Ovario quístico	ID		PG		RD	IA
Sincronización de celo	ID+BE2		RD+PG	BE1	IATF	

REFERENCIAS:

- ID= Insertar dispositivo.
- RD= Retirar dispositivo.
- BE1= Aplicar 1 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
- BE2= Aplicar 2 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
- eCG= Aplicar 400 a 500 UI de Gonadotropina Coriónica Equina.
- PG= Aplicar 500 µg (2 ml) de Cloprostenol (Veteglan)
- En vaquillonas reducir la dosis en ambos casos.
- IA= Inseminación artificial.
- IATF= Inseminación artificial a tiempo fijo.

Resincronización de los retornos al servicio o IA:

Es posible realizar una resincronización a fin de detectar los animales que no hayan quedado preñados. A este fin se colocan dispositivos nuevos el día 13 (día 0 = IA), se retiran el día 20 y se insemina a celo detectado los días 21 a 25. Los programas de uso pueden ser modificados de acuerdo al criterio del Médico Veterinario actuante.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Intravaginal.

ESPECIES DESTINADAS:

Bovinos.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.
- No administrar en animales con endometritis, vaginitis o vulvovaginitis.
- No administrar en animales hipersensibles al principio activo y/o componentes del excipiente.
- No utilizar en animales desnutridos.
- No utilizar en animales prepúberes.
- No utilizar en los primeros 30 días posteriores al parto.

RESTRICCIONES DE USO:

- Tiempo de retiro pre-ordeño: 0 días.
- Tiempo de retiro pre-faena: 0 días.

APLICADOR PLUSELAR MODO DE USO:

Paso 1: Tomar el aplicador por su extremo libre e introducir el pluselar.



Paso 2: Asegurarse que el pluselar quede perfectamente calzado en el canal vaginal del aplicador con la colita extractora sobresaliendo.



Paso 3: Tomar el aplicador cargado e introducirlo en la vagina previamente higienizada. Una vez que llegue al fondo de la vagina presionar el émbolo para descargar el pluselar y retirar luego el aplicador vacío.



Es recomendable realizar la desinfección de los aplicadores antes de su uso y entre animal y animal. A este fin se deben utilizar desinfectantes aprobados, especialmente aquellos en base a amonios cuaternarios.

PRECAUCIONES DE USO:

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo. Limpiar la zona perivulvar antes de la aplicación del dispositivo. Lubricar el aplicador (lubricante obstétrico) antes de la aplicación (sobre todo en vaquillonas). Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador luego de cada uso.

ADVERTENCIAS:

En animales de pobre condición corporal es posible no obtener el efecto esperado.

PRODUCTO PARA EL MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN
El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido del producto.

PRESENTACIÓN:

Una bolsa conteniendo 10 dispositivos intravaginales y 10 colitas extractoras

CONSERVACIÓN:

Entre 4°C y 30°C, en lugar fresco, seco y protegido de la luz.



PLUSELAR 1,2

Pluselar es un dispositivo intravaginal impregnado con Progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada dispositivo intravaginal contiene: Progesterona (4-pregnano 3,20-diona) micronizada 1,2 g. Silicona Inerte c.s.p. un dispositivo intravaginal.

INDICACIONES:

- Control del ciclo estral en vaquillonas/novillas y vacas.
- Tratamiento del anestro posparto.
- Acortamiento del período parto concepción.

El producto se aplicará de acuerdo a los siguientes programas:

INDICACIÓN	DÍA 0	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9	DÍA 10
Anestro	ID+BE2			RD+eCG+PG	BE1	IA
Celo silencioso	ID+BE2	PG	RD		IA	
Ovario quístico	ID		PG		RD	IA
Sincronización de celo	ID+BE2		RD+PG	BE1	IATF	

REFERENCIAS:

- ID= Insertar dispositivo.
- RD= Retirar dispositivo.
- BE1= Aplicar 1 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
- BE2= Aplicar 2 mg de Benzoato de Estradiol Calier.
- eCG= Aplicar 400 a 500 UI de Gonadotropina Coriónica Equina.
- PG= Aplicar 500 µg (2 ml) de Cloprostenol (Veteglan)
- En vaquillonas reducir la dosis en ambos casos.
- IA= Inseminación artificial.
- IATF= Inseminación artificial a tiempo fijo.

Resincronización de los retornos al servicio o IA:

Es posible realizar una resincronización a fin de detectar los animales que no hayan quedado preñados. A este fin se reinsertan los dispositivos el día 13 (día 0= IA), se retiran el día 20 y se insemina a celo detectado los días 21 a 25. Los programas de uso pueden ser modificados de acuerdo al criterio del Médico Veterinario actuante.

Dosis recomendada para uso en vacas lecheras.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Intravaginal.

ESPECIES DESTINADAS:

Bovinos.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.
- No administrar en animales con endometritis, vaginitis o vulvovaginitis.
- No administrar en animales hipersensibles al principio activo y/o componentes del excipiente.
- No utilizar en animales desnutridos.
- No utilizar en animales prepúberes.
- No utilizar en los primeros 30 días posteriores al parto.


RESTRICCIONES DE USO:

- Tiempo de retiro pre-ordeño: 0 días.
- Tiempo de retiro pre-faena: 0 días.


APLICADOR PLUSELAR

MODO DE USO:


Paso 1: Tomar el aplicador por su extremo libre e introducir el pluselar.



Paso 2: Asegurarse que el pluselar quede perfectamente calzado en el canal vaginal del aplicador con la colita extractora sobresaliendo.



Paso 3: Tomar el aplicador cargado e introducirlo en la vagina previamente higienizada. Una vez que llegue al fondo de la vagina presionar el émbolo para descargar el pluselar y retirar luego el aplicador vacío.



Es recomendable realizar la desinfección de los aplicadores antes de su uso y entre animal y animal. A este fin se deben utilizar desinfectantes aprobados, especialmente aquellos en base a amonios cuaternarios.

PRECAUCIONES DE USO:

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo. Limpiar la zona perivulvar antes de la aplicación del dispositivo. Lubricar el aplicador (lubricante obstétrico) antes de la aplicación (sobre todo en vaquillonas).

Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador luego de cada uso.

En caso de reuso de dispositivos es necesario lavar y desinfectar los mismos antes de su reinsertación.

ADVERTENCIAS:

En animales de pobre condición corporal es posible no obtener el efecto esperado.

PRODUCTO PARA EL MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN

El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido del producto.

PRESENTACIÓN:

Una bolsa conteniendo 10 dispositivos intravaginales y 10 colitas extractoras

CONSERVACIÓN:

Entre 4°C y 30°C, en lugar fresco, seco y protegido de la luz.