Oxytocina Pituitaria Calier

Hormonas y análogos de la pituitaria y el hipotálamo

CALIER. All rights reserved

Forma farmacéutica:
Solución inyectable.

Composición
Oxitocina 20 UI Clorobutanol hemihidrato 4,75 mg.

Indicaciones*
Inducción al parto. Inercia o atonía uterina. Involución del útero tras cesáreas y disminución de hemorragias. Expulsión de secundinas y restos de exudados tras el parto. Iniciación a la lactación tras el parto. Agalaxia de la cerda. Piometritis y endometritis crónicas para provocar la expulsión de exudados. Tratamiento coadyuvante a la terapia antibiótica de la mastitis aguda y crónica, para provocar la expulsión de residuos y facilitar el drenaje.

Posología*
Obstetricia (vías intravenosa, intramuscular, subcutánea): Vacas: 75 - 100 U.I. de oxitocina (equivalente a 3,75 - 5 ml). Yeguas: 75 - 150 U.I. de oxitocina (equivalente a 3,75 - 7,5 ml). Cerdas, ovejas y cabras: 30 - 50 U.I. de oxitocina (equivalente a 1,5 - 2,5 ml). Perras: 5 - 25 U.I. de oxitocina (equivalente a 0,25 - 1,25 ml). Gatas: 5 - 10 U.I. de oxitocina (equivalente a 0,25 - 0,5 ml). Eyección láctea (preferentemente vía intravenosa): Vacas y yeguas: 10 - 20 U.I. de oxitocina (equivalente a 0,5 - 1 ml). Cerdas, ovejas y cabras: 5 - 20 U.I. de oxitocina (equivalente a 0,25 - 1 ml.). Perras: 2 - 10 U.I. de oxitocina (equivalente a 0,1 - 0,5 ml). Gatas: 1 - 10 U.I. de oxitocina (equivalente a 0,05 - 0,5 ml). La administración puede repetirse cada 30 minutos, si el veterinario lo considera necesario.

Contraindicaciones
No usar en los siguientes casos: Hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Distocias por presentación anormal, desproporción pélvica-fetal o cualquier tipo de obstrucción mecánica. Enfermedades cardiovasculares. Hembras con predisposición a ruptura uterina. Cuando no exista dilatación del cuello uterino (en la inducción al parto).

Tiempo de espera*
Carne: Cero días. Leche: Cero días.

Propiedades farmacológicas
Hormona sintetizada en el hipotálamo y liberada en la parte posterior de la glándula pituitaria, obtenida sintéticamente, perteneciente al grupo de los oxitócicos.

Presentación
Frasco de 50 ml.

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.
Maturin 2745 (C1416CTM) - CABA - Buenos Aires - Argentina.
Tel.: (011) 4582-8668 - calier@calier.com.ar