



ZODALBEN 12,5%

FORMA FARMACÉUTICA:

ANTIPARASITARIO INTERNO

COMPOSICIÓN:

Albendazol	12,5 g
Vehículo suspensionante c.s	s.p100 ml

INDICACIONES:

Su espectro de acción comprende tanto formas adultas como larvas y huevos. Bóvidos: Nematodos gastrointestinales: Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei. T. Colubriformis, Cooperia oncophora, Oesophagostomun radiatum, Haemonchus contortus. Nematodirus helvatianus Nematodos pulmonares: Dictycaulus viviparus. Cestodos: Moniezia expansa. Trematodos: Fasciola hepática. Óvidos y cápridos: Nematodos gastrointestinales: Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, O. Trifurcata, Trichostrongylus axei. T. Colubriformis, T. Vitrinus, Coopería curricci, Nematodirus filicollis, Chabertía ovina, Oesophagostomum venulosum. Nematodos pulmonares: Dictyocaulus filaria. Cestodos: Moniezia benedi, M. Expansa, M. Denticulata. Trematodos: Fasciola hepática.

DOSISYVIA DE ADMINISTRACIÓN:

Se administra en óvidos, cápridos y bóvidos por vía oral mediante pistola dosificadora bucal.

POSOLOGÍA: Tratamiento de parasitos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 7,5 mg/kg p.v, equivalente a 0,04 ml de Zodalben 12,5% /kg p.v. (4 ml cada 100 kg de p.v), en dosis única. Tratamiento de Ostertagia inhibida o hipobiótica 0,06 ml de Zodalben 12.5% /kg p.v (6ml cada 100 kg p.v) en dosis única. Tratamiento de fasciolosis 10 mg/kg. p.v. equivalente a 0,08 ml de Zodalben 12.5% /kg p.v.(8 ml cada 100 kg de p/v) en dosis única .

Óvidos y cápridos: Tratamiento de parasitos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 5 mg/ kg p.v. equivalente a 0,04 ml de Zoldalben 12,5% kg. p.v. (4ml cada 100 kg p.v) en dosis única. Tratamiento de fasciolosis: 7,5 mg/kg p.v, equivalente a 0,06 ml Zodalben 12,5 % p.v. (6 ml cada 100 kg p.v), en dosis única.

CONTRAINDICACIONES:

No se han descrito.

TIEMPO DE RETIRO:

Óvidos y cápridos : carne: 10 días - Bóvidos: carne 14 días; leche: 4 días.

PRESENTACIÓN:

Bidon 5 lts.

