



TRIBEN CALIER

FORMA FARMACÉUTICA:

Antiparasitario Interno Oral
Saguaypicida

COMPOSICIÓN:

Triclabendazol 10 %

INDICACIONES:

Agente antihelmíntico saguaypicida (Fasciola hepática, formas adultas y jóvenes inmaduras desde las 2 semanas siguientes a la infección).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

12 mg Triclabendazol/kg de peso vivo. - Dosis práctica: 12 ml/100 kg de peso vivo. Administrar por vía oral con pistola dosificadora.

La administración de una dosis exclusiva es suficiente para cumplir el tratamiento antiparasitario. Sin embargo, es conveniente repetir la dosificación con un intervalo de 8 a 10 semanas en la temporada de mayor incidencia de fasciolosis y con un intervalo de 5 - 6 semanas en casos agudos y subagudos. La repetición de la dosificación queda a criterio del profesional actuante.

CONTRAINDICACIONES:

No debe ser administrado con Bromosalanos.

No presenta incompatibilidad con otros fármacos. Agitar correctamente antes de dosificar. Se recomienda inutilizar los envases una vez usado el producto.

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS EN ANIMALES:

Sólo se pueden registrar ligeros trastornos con dosis hasta 20 veces superiores a la especificada. Por lo tanto empleando el producto en la forma y dosis indicada, no es posible la aparición de síntomas de intoxicación. De producirse sobredosificación no deseada, en virtud de la inexistencia de antídotos específicos, sólo podrá aplicarse una terapia sintomática.

Tiempo que debe transcurrir entre el último día de tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano: 28 días.

No administrar a bovinos lecheros cuya leche se destine a consumo humano.

CONSERVACIÓN:

Entre 15° y 25° C.

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

PRESENTACIÓN:

Bidon mochila por 2,5 litros.

