



ZOBIOTIC 50% ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Antibiótico en polvo para uso oral.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contiene Amoxicilina base (como trihidrato) 50 g.; Excipiente c.s.p.

INDICACIONES:

Zoobiotic 50 % Oral, es un producto elaborado a base de Amoxicilina, antibiótico semisintético, bactericida y de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones sistémicas o localizadas causadas por gérmenes gram positivos y gram negativos sensibles: Infecciones del aparato respiratorio, digestivo, genito urinario, de piel y tejidos blandos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Dosis de referencia: **Porcinos:** 400 mg de producto por cada 10 kg de peso corporal y por día durante 5 a 7 días consecutivos por vía oral. **Pollos parrilleros:** 300 a 400 mg de producto por cada 10 kg de peso corporal y por día durante 5 a 7 días consecutivos por vía oral.

Dosis práctica: **Porcinos:** 1,0 kg por cada 1.000 kg de alimento; 500 g por cada 1.000 litros de agua. **Pollos parrilleros:** 250 a 500 g por cada 1.000 kg de alimento; 125 a 250 g por cada 1.000 litros de agua. **Terminos pre-rumiantes:** 160 – 200 mg de producto por cada 10 kg de peso cada 12 horas (dos veces por día) Administrar hasta 48 horas posteriores a la desaparición de los síntomas. No administrar por más de cinco días. Para asegurar una dosificación correcta, la concentración del producto será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua o alimento al inicio del tratamiento.

Administración: **Terminos pre-rumiantes:** Administrar con el agua de bebida, leche, o sustituto lácteo. **Porcinos y Pollos parrilleros:** En el agua de bebida: Preparar soluciones frescas diariamente. Diluir el producto en una pequeña cantidad de agua y luego incorporar esta solución al agua de bebida hasta obtener una mezcla homogénea.

En el alimento: El día de su administración efectuar una premezcla con 5 a 10 kg de alimento y luego incorporarla al total del alimento. Controlar bien el mezclado al agregar el producto, asegurando que resulte homogéneo. Se debe asegurar que los animales tengan libre acceso al agua de bebida y alimento medicados y evitar el acceso a otras fuentes de bebida o alimento mientras los animales se encuentren bajo medicación. Al final del tratamiento el sistema para suministro de agua o alimento deben ser limpiados adecuadamente a fin de evitar la ingestión de cantidades restantes. El agua o alimento medicado no utilizado en el plazo de 24 horas, deben ser desechados.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales con antecedentes de alergia a los antibióticos betalactámicos. No administrar conjuntamente con antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana ni con antibióticos bacteriostáticos como sulfas y tetraciclinas. Neomicina bloquea la absorción de Amoxicilina.

TIEMPO DE RETIRO:

Terminos: 20 días; Porcinos: 15 días; Pollos parrilleros : 5 días.

PRESENTACIÓN:

Balde de 5 kg.