



TILCOMINA FLUX

FORMA FARMACÉUTICA:

Antibiótico – Analgésico – Antipirético

COMPOSICIÓN:

cada 100 ml:
Tilmicosina 30,0 g, Flunixin 3,9 Excipientes
c.s.p 100,0 ml.

INDICACIONES:

TILCOMINA FLUX es un antibiótico inyectable, estéril, indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos GRAM (+), GRAM (-) y micoplasmas sensibles a la Tilmicosina.

Formulado especialmente para la especie bovina, Tilcomina Flux está asociado a un antiinflamatorio no esteroide con potente acción analgésica y antipirética altamente eficaz para el tratamiento de las enfermedades respiratorias en bovinos (ERB), Fiebre del Embarque, Pietín, Neumonía en terneros y Queratoconjuntivitis Infecciosa.

Los siguientes microorganismos son susceptibles al uso de este producto: *Actinobacillus* spp, *Bacteroides melaninogenicus*, *Bacteroides nodosus*, *Fusobacterium necrophorum*, *Haemophilus* spp, *Moraxella Bovis*, *Pasteurella* spp, *Pasturella haemolitica*, *Pasteurella multocida*, *Prevotella intermedia*, *Porphyromonas assacharolytica*.



ESPECIE INDICADA:

Bovinos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Como dosis se sugiere: 5 a 10 mg de Tilmicosina por kg de peso vivo. En casos de Neumonía: 1 ml cada 30 kg de peso vivo.

En casos de Pietín: 1 ml cada 60 kg de peso vivo. En casos de Queratoconjuntivitis: 1 ml a 2 ml cada 60 kg de peso vivo. Dosis mayores de 10 ml se deben administrar en dos puntos diferentes de inyección para reducir el malestar ocasional transitorio o la reacción en el lugar de aplicación. Aplicación Subcutánea, en el cuello o por detrás de la paleta.

RESTRICCIONES DE USO:

No sacrificar animales con destino a consumo humano durante el tratamiento y hasta 28 días posteriores al mismo.

No administrar a animales en producción de leche, cuando la misma se destine a consumo humano con o sin manufactura previa.

CONTRAINDICACIONES:

La aplicación de este producto debe ser solo por la vía subcutánea, dado que la naturaleza irritante del activo puede provocar dolor agudo durante su administración.

La tilmicosina tiene una toxicidad cardíaca elevada, sobre todo en algunas especies como cerdos, cabras, perros y caballos cuando se administra por vía intramuscular; debido a que provoca un brusco descenso de los niveles de calcio. Por este motivo el producto está contraindicado en otras especies que no sea la bovina.

PRECAUCIONES DE USO:

No administrar en animales con hipersensibilidad a los activos. No administrar a animales con insuficiencia hepática, renal o cardíaca. No administrar en hembras gestantes. No administrar conjuntamente con carbamezapina, corticosteroides, digoxina, teofilina y warfarina. Lavar las manos con abundante agua y jabón después de aplicar el producto. Para su aplicación utilizar jeringas y agujas estériles. No mezclar en la misma jeringa con otras soluciones inyectable. Aplicar con material limpio y seco siguiendo procedimientos asépticos. Este, al igual que otros medicamentos debe ser administrado por un Médico Veterinario. El uso de este producto es ampliamente seguro si se respeta la vía de aplicación. De utilizar, por error, la vía intramuscular o endovenosa puede provocar dolor o tromboflebitis de aplicarse por esta última vía de aplicación. En caso de intoxicación suspender el producto y aplicar tratamiento sintomático.

INTOXICACIÓN EN SERES HUMANOS:

La tilmicosina es potencialmente cardiotoxica para el hombre, por lo que debe manejarse con precaución para evitar inyecciones accidentales. Si en forma accidental o intencional una persona se inyecta el producto recurrir a algunos de los centros de referencia con el prospecto, etiqueta o estuche de este producto. En este caso, se debe controlar el sistema cardiovascular y realizar tratamiento de apoyo.

CONSERVACIÓN:

Mantener entre 5 y 25 °C, en lugar adecuado, fresco y seco, fuera del alcance de los niños y personal no autorizado.

PRESENTACIÓN:

Frasco 100 ml.