



LINALTEN LACTANCIA

FORMA FARMACÉUTICA:

Antibiótico intramamario para vacas en lactancia.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Lincomicina (Clorhidrato).....	3,3g
Neomicina (Sulfato)	1,0 g
Prednisolona	0,2 g
Excipientes c.s.p	100,0 ml

INDICACIONES:

Asociación de 2 antibióticos y un corticoide, aconsejado en el tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas en vacas en lactancia y vaquillonas, causadas por bacterias sensibles a la Lincomicina y Neomicina o su combinación incluidas aquellas que producen beta-lactamasas.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos en lactancia y vaquillonas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración intramamaria. Extraer en lo posible la totalidad de la leche en el cuarto a tratar, limpiar y desinfectar el pezón antes de la administración. Introducir el contenido completo de una jeringa a través del conducto galactóforo en cada cuarto afectado. A fin de favorecer la difusión del producto, es conveniente dar un ligero masaje ascendente luego de la administración.

Administrar una jeringa por cuarto mamario afectado cada 24 horas. Se recomienda un mínimo de 2 aplicaciones. Según criterio del Médico Veterinario, el tratamiento puede repetirse cada 12 o 24 horas. Según criterio profesional el tratamiento puede prolongarse.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con antecedentes de sensibilidad a los principios activos. Evitar el contacto del producto con la piel del operador. Si se llegara a producir contacto lavar la zona con abundante agua. En caso de Hipersensibilidad, aplicar tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN:

La Lincomicina está contraindicada en los pacientes que hayan mostrado ser alérgicos a este antibiótico o a la Clindamicina. No se recomienda la administración de Lincomicina a pacientes con historia de alteraciones gastrointestinales, en particular con historia de colitis.

RESTRICCIONES DE USO/ PERIODO DE RETIRO:

La leche de los animales tratados no debe destinarse para consumo humano antes de las 84 hs del último tratamiento.

CONSERVACIÓN:

Consérvese en su envase original, en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa, entre 15 °C y 30 °C.

PRESENTACIÓN:

Envase de 24 jeringas x 10 ml.

