ROXACIN INYECTABLE

Solución inyectable **Especialidad de uso veterinario**

COMPOSICIÓN:
Enrofloxacina .....10 g
Excipiente c.s.p. .....100 ml

INDICACIONES: Bóvinos: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica y Mycoplasma spp.* Tratamiento de la mastitis aguda grave causada por cepas de *Escherichia coli.* Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de Escherichia coli. Tratamiento de septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacina. Tratamiento de artritis aguda asociada a micoplasmas, causada por cepas de *Mycoplasma bovis* sensibles a la enrofloxacina en bovinos de menos de 2 años de edad.
Cerdos: Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida, Mycoplasma spp y Actinobacillus pleuropneumoniae.* Tratamiento de las infecciones del tracto urinario causadas por cepas de Escherichia coli. Tratamiento del síndrome de disgalactia posparto (SDP) / síndrome de mastitis, metritis y agalactia (MMA) causado por cepas de *Escherichia coli y klebsiella spp.* Tratamiento de infecciones del tracto digestivo causadas por *Escherichia coli.* Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacina.
ESPECIES DE DESTINO: Cerdos y bóvinos.
MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos: Administrar por vía subcutánea 2,5 mg de enrofloxacina/kg p.v. por día durante 3 días (0,25 mL de Roxacin Inyectable / 10 kg p.v.). Esta dosis puede ser doblada a 5 mg/kg p.v. (0,5 mL / 10 kg p.v.) durante 5 días en enfermedades respiratorias complicadas.
Cerdos: Administrar por vía intramuscular: 2,5 mg de enrofloxacina/kg p.v. por día durante 3 días (0,25 mL de Roxacin Inyectable / 10 kg p.v.). Esta dosis puede ser doblada a 5 mg/kg p.v. (0,5 mL / 10 kg p.v.) durante 5 días en enfermedades respiratorias complicadas.
CONTRAINDICACIONES: no administrar en casos de hipersensibilidad cutánea, en caso de resistencias conocidas frente a las quinolonas, ya que existe resistencia cruzada casi completa. Frente a la fluorquinolona la resistencia cruzada es completa. No se debe administrar en animales con trastornos del crecimiento cartilaginoso.
INTERACCIONES: posee un efecto antagónico: tetraciclina.
Por razones tóxicas: sulfametoxanol-trimetropim.
Por razones farmacocinéticas: metales divalentes (Mg) y trivalentes (Al) por reducirse la absorción.
Por su unión a proteínas plasmáticas no se administrará junto con aspirina, hidrocortisona, fenilbutazona, sulfamidas que por poseer una unión más fuerte desplacen mayor cantidad de enrofloxacina libre en sangre.
EFECTOS SECUNDARIOS: pueden presentarse lesiones locales de los tejidos en el punto de inyección.
SOBREDOSIFICACIÓN: la dosis máxima tolerada es de dos veces la dosis terapéutica.
Riesgo de fotosensibilización y erupciones alérgicas, acompañada de artralgia.
Suprimir la medicación y aplicar tratamiento sintomático.
ADVERTENCIAS PARA CADA ESPECIE DE DESTINO: No administrar en cerdas en gestación.
TIEMPO DE ESPERA: Cerdos: 10 días. **Bóvinos:** 13 días. No administrar a bovinos cuya leche se destine al consumo humano con o sin industrialización previa.
CONSERVACIÓN: mantener en un lugar fresco y seco y al abrigo de la luz. Entre 15 y 25°C.

VENTA BAJO RECETA.

CALIER - All rights reserved

Importado y distribuido por:
LABORATORIOS CALIER ARGENTINA, S.A.
Maturín 2745
B

CALIER

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (ESPAÑA