



CLOXACUM MAX P

FORMA FARMACÉUTICA:

Tratamiento intramamario para vacas en período de secado.

COMPOSICIÓN:

Ampicilina (como trihidrato)	250 mg
Cloxacilina (como benzatina).....	500 mg
Papaína	20 mg
Excipientes c.s.p.....	4,5 g

INDICACIONES:

La Cloxacilina benzatina es un antibiótico que pertenece al grupo de las isoxazol-penicilinas, sustancias que combinan una buena estabilidad en medio ácido (Es muy útil para el tratamiento de las mastitis, ya que la inflamación producida en la ubre tiene un pH marcadamente ácido), con una resistencia a la penicilinas producida por los estreptococos. La principal aplicación, se centra en el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes gram positivos resistentes a la penicilina, especialmente estafilococos.

La Ampicilina trihidrato es un antibiótico semisintético también estable en medio ácido que facilita la acción a nivel local cuando se administra por vía intramamaria, puesto que se dificulta su expulsión por ser menos soluble en agua que la sal sódica.

La ampicilina es básicamente bacteriostática. La Papaína es un agente proteolítico que ejerce su acción como antiinflamatorio eliminando tejidos necrosados y coágulos de las áreas lesionadas.

Para el tratamiento de las mastitis en proceso de secado, producidas por bacterias Gram positivas y Gram negativas.

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Aerobacter, Corynebacterium piógenes, Pseudomonas. Prevención y tratamiento de las mastitis subclínicas durante el período de secado, destinado a la especie bovina.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: una jeringa por cuarto. Administrar una vez. Extraer en lo posible la totalidad de la leche de la ubre afectada y lavar con agua tibia y un desinfectante. Secar cuidadosamente y topicar cada pezón con un algodón embebido en un antiséptico.

Introducir el contenido completo de una jeringa a través del conducto galactóforo.

A fin de favorecer la difusión del producto, es conveniente dar un ligero masaje ascendente.

Al terminar el tratamiento se recomienda el sellado de los pezones.

Las personas que realicen los tratamientos, deben lavar y secar sus manos luego de cada tratamiento.

ESPECIES:

Bovinos.

CONTRAINDICACIONES: El producto está contraindicado en animales sensibles a cualquiera de los principios activos. No administrar junto con penicilina.

CONSERVACIÓN:

El producto debe ser conservado entre 15°C y 25°C, alejado de la luz solar.

RESTRICCIONES DE USO:

Discontinuar el tratamiento 28 días antes de la faena del animal para consumo humano.

Deberán transcurrir al menos treinta días entre la aplicación del producto y el parto. No enviar a consumo la leche producida en las primeras 72 horas después del parto. En el caso en que el parto se produzca antes de 30 días contados a partir de la aplicación del producto, se deberá testear la leche hasta obtener dos resultados negativos a antimicrobianos.

PRESENTACIÓN: Por 120 / 24 jeringas de 4,5 g.