Cipionato de Estradiol Calier

CALIER - All rights reserved

Forma farmacéutica:
El Cipionato de Estradiol (CPE) es un derivado semisintético de acción prolongada del 17 Beta Estradiol, hormona esteroidea sintetizada por el folículo ovárico, desarrollada para optimizar los resultados de los tratamientos con progestágenos en bovinos.



Composición
Cipionato de Estradiol 1 mg, Excipientes c.s.p. 1 ml.

Indicaciones
Se trata de una formulación hormonal indicada para: Corrección del anestro, tratamiento de cuerpos lúteos persistentes, piometra, expulsión de placenta y fetos momificados retenidos. En vacas y vaquillonas se utiliza para sincronización de celo en programas de inseminación artificial a tiempo fijo. En caninos además está indicado como terapia de reposición en hembras castradas que sufren de incontinencia urinaria, tratamiento de pseudopreñez y para el tratamiento de la hipertrofia prostática. En bovinos y caninos puede ser utilizado para provocar la interrupción de la gestación no deseada.

Especies de destino
Bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.

Dosificación
Vacas: Tratamiento del anestro: 3 a 5 mg (3 a 5 ml). Tratamiento de piómetra, placenta retenida y expulsión de fetos momificados: 10 mg (10 ml). Cuerpo lúteo persistente: 4 mg (4 ml). Interrupción de la preñez: 4 a 8 mg (4 a 8 ml) aplicados en el 4º día del servicio o 20 mg (20 ml) aplicados entre el 4º a 7º mes de gestación. Sincronización de celo en IATF: 1mg (1 ml), al momento de retirar el dispositivo y aplicar la prostaglandina. Yeguas: Anestro: 5 a 10 mg (5 a 10 ml). Cerdas y Ovejas: Anestro: 0,5 a 1 mg (0,5 a 1 ml). Caninos: Anestro: 0,5 a 1 mg (0,5 a 1 ml).
Incontinencia urinaria: 0,5 a 1 mg (0,5 a 1 ml). Pseudopreñez: 0,5 a 1 mg (0,5 a 1 ml). Piómetra: 1 a 2 mg (1 a 2 ml). Hipertrofia prostática: 1 a 2 mg (1 a 2 ml). Interrupción de la preñez: 0,5 a 2 mg (0,5 a 2 ml) aplicados dentro de las 72 horas posteriores al coito. Gatas: Anestro: 0,25 a 0,5 mg (0,25 a 0,5 ml).

Vía de administración
Intramuscular.

Contraindicaciones
- No administrar en animales hipersensibles a los principios activos.
- No administrar a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.
- No administrar en animales afectados por neoplasias uterinas o mamarias.
- No debe aplicarse a vacas en producción de leche destinado a consumo humano.
- No tiene período de restricción prefaena.

Conservación
Entre 15ºC y 30ºC, y al abrigo de la luz solar directa.

Presentación
Frasco 100ml.

LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA S.A.
Maturin 2745 (C1416CTM) - CABA - Buenos Aires - Argentina.
Tel.: (011) 4582-8668 - calier@calier.com.ar