Calier B8

Ref. 14146-009

Solución Inyectable

Hidrocloruro de tiamina, fosfato sódico de riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, cianocobalamina, nicotinamida, dexpantenol

Composición cualitativa y cuantitativa de las sustancias activas y otras sustancias:

Cada ml contiene:

Sustancias activas:

Hidrocloruro de tiamina (vitamina B1)	10,4 mg
Fosfato sódico de riboflavina (vitamina B2)	4,20 mg
Hidrocloruro de piridoxina (vitamina B6)	4,20 mg
Cianocobalamina (vitamina B12)	0,05 mg
Nicotinamida	20 mg
Dexpantenol	4,30 mg

Excipientes:

Alcohol bencílico (E 1519)	17,8 mg
----------------------------------	---------

Solución transparente de color naranja.

Indicaciones de uso: En todas las especies, tratamiento y prevención de deficiencias de vitaminas del grupo B.

Contraindicaciones: No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

Reacciones adversas: No se han descrito. Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario. Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía tarjeta verde. https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc

Especies de destino: Bovino, ovino, caprino, porcino y potros

Posología para cada especie, modo y vías de administración: Administración por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa

Bovino y porcino: 30 - 50 ml/animal. Lechones: 3 ml/animal. Terneros y potros: 10 ml/animal. Ovino y caprino: 1 - 3 ml/animal.

Instrucciones para una correcta administración: No procede.

Tiempos de espera: Carne: Cero días. Leche: Cero días

Precauciones especiales de conservación: Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz. No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta o en la caja después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado. Período de validez después de abierto el envase: 28 días

Advertencias especiales:

Advertencias especiales para cada especie de destino:

Ninguna.

Precauciones especiales para su uso en animales:

Respetar la pauta posológica. No se deben administrar dosis superiores a las recomendadas.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Las personas con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas deben administrar el medicamento veterinario con precaución. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Gestación y lactancia:

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia a las dosis establecidas. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Interacciona con antagonistas de la tiamina.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario:

La administración de dosis elevadas y/o durante periodos prolongados de piridoxina puede dar lugar a la aparición de manifestaciones tóxicas como ataxia, debilidad muscular y descoordinación.

Incompatibilidades:

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez: Noviembre de 2018

Información adicional: Tamaño del envase: Formato: Caja con 1 vial de 100 ml.

Nº de registro: 3708 ESP.

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario (en el caso de administración intravenosa) o bajo su supervisión y control.

CALIER - All rights reserved