

AdoEQMINA

Chlorhexidina digluconato



Ref.: 27852-004

ES Composición cualitativa y cuantitativa de las sustancias activas y otras sustancias: Cada ml contiene: Sustancia activa: Chlorhexidina digluconato 10 mg. Excipientes: Alcohol bencílico 0,02 ml.

Indicaciones de uso: Desinfección de la piel, erosiones, pequeñas heridas, quemaduras leves y rozaduras.

Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y/o a algún excipiente.

Reacciones adversas: Ocasionalmente pueden observarse reacciones de hipersensibilidad y fotosensibilidad. El uso repetitivo durante largo tiempo puede producir en algunos casos dermatitis.

Especies de destino: Caballos, perros y gatos.

Posología para cada especie, modo y vías de administración: Emplear sin diluir. Limpiar y secar la zona a tratar antes de administrar el medicamento. El tratamiento puede ser aplicado una vez al día o más veces si el veterinario lo considera oportuno.

Aunque el aplicador constituye el modo de aplicación idóneo, también puede aplicarse mediante toques con una torunda de algodón empapada en el medicamento.

Instrucciones para una correcta administración: No procede.

Tiempo de espera: Carne: cero días.

Precauciones especiales de conservación: Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. Período de validez del medicamento veterinario una vez abierto el envase: 1 año.

Advertencias especiales: Precauciones especiales de uso. Precauciones especiales para su uso en animales: No debe utilizarse en heridas profundas y extensas. No debe utilizarse para la asepsia de zona de punción o de inyección ni para la desinfección del material quirúrgico. No utilizar en los ojos, oídos ni en el interior de la boca u otras mucosas. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental, aplicar un tratamiento sintomático, sin embargo, dada su baja toxicidad y su escasa absorción por vía digestiva no es de esperar efecto alguno. Las crías no deberán entrar en contacto con hembras lactantes después del tratamiento hasta que el pelaje se haya secado por completo. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales:** Las personas con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Este medicamento puede causar irritación en ojos. Evitar el contacto con los ojos, si se produjera, lavar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta. No comer, beber ni fumar mientras se manipula el producto. Lavarse las manos después de su uso. **Otras precauciones:** La ropa blanca sobre la que haya goteado clorhexidina no debe ponerse en contacto con lejía ya que podrían quedar manchas permanentes. **Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta:** No se han descrito contraindicaciones durante estos períodos. **Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario:** El modo de empleo hace poco probable una intoxicación por sobredosificación. **Incompatibilidades:** Con los detergentes aniónicos.

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez: 11 Octubre de 2013

Información adicional: Formatos: Caja con 1 frasco con 200 ml. Caja con 1 frasco con 70 ml. Es posible que no se comercialicen todas las presentaciones. Condiciones de dispensación: Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

Reg. nº 384 ESP

Titular de la autorización de comercialización y fabricante:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/Barcelonès, 26 (El Ramassar)

Les Franqueses del Vallès, (Barcelona)

España

AdoEQMINA



Chlorhexidine digluconate

EN Statement of the active substances and other ingredients: Each ml contains: Active substance: Chlorhexidine digluconate 10 mg. Excipients: Benzyl Alcohol 0.02 ml

Indications for use: Skin disinfection, skin erosion, minor injuries, low burnings and abrasión.

Contraindications: Do not use in case of hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.

Adverse reactions: Occasionally, hypersensitivity and photosensitivity reactions may occur. The prolonged use of the product may cause some cases of dermatitis.

Target species: Horses, dogs and cats.

Dosage for each species, routes and method of administration: Use undiluted. Clean and dry the area to be treated before administering the drug. Treatment may be applied once a day or more in accordance veterinary criteria. Although the applicator is the ideal application mode, also can be applied by touch with a cotton swab soaked in the drug.

Advice on correct administration: Not applicable.

Withdrawal period: Meat: zero days.

Special storage precautions: Shelf-life after first opening the immediate packaging: one year. This veterinary medicinal product does not require any special storage conditions.

Special warnings: Special precautions for use. **Special precautions for use in animals:** The veterinary medicinal product should not be used in deep and extensive. It should not be used for the asepsis of punction or injection zone neither for the disinfection of surgical material. Do not use in eyes, ears neither inside the mouth and other mucosae. In case of accidental contact, rinse with plenty of water. In case of accidental ingestion, apply a symptomatic treatment. However, due its low toxicity and the poor absorption by digestive tract no effect should be expected. Breed should no contact with pregnant females after treatment until the complete dry of the animal. **Special precautions to be taken by the person administering the veterinary medicinal product to animals:** People with known hypersensitivity to clorhexidine should avoid contact with the veterinary medicinal product. This veterinary medicinal product can cause eyes irritation. Avoid eyes contact. In case of eyes contact rinse immediately with plenty of water. If the irritation persists seek medical advice and show the label or leaflet of the product. Do not eat, drink or smoke while handle the product. Wash the hands after use. **Other precautions:** White clothes that have been sprinkled with clorhexidine should no contact with bleach because permanent spot can be produced. **Use during pregnancy, lactation or lay:** No contraindications have been described during these periods. **Overdose (symptoms, emergency procedures, antidotes):** The administration route makes few probably the intoxication for overdose. **Incompatibilities:** With anionic detergents.

Special precautions for the disposal of unused products or waste materials, if any: Any unused veterinary medicinal products or waste material derived from such veterinary medicinal product should be disposed of in accordance with local requirements.

Date on which the package leaflet was last approved: 11 October 2013

Other information: Without veterinary prescription. Not all pack size may be marketed.

The marketing authorisation holder and manufacturer:

CALIER
LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/Barcelonès, 26 (El Ramassar)
Les Franqueses del Vallès, (Barcelona)
Spain