Veteglan® 0.075 mg/ml

Ref. 17225-004

Soluzione iniettabile per bovine, suini (scrofe) e cavalle

d-Cloprostenolo

Indicazione del principio attivo e degli altri ingredienti: 1 ml di soluzione contiene: Principio attivo: d-cloprostenolo 0.075 mg equivalente a d-cloprostenolo sale di sodio 0.079 mg. Eccipienti: Clorocresolo, acqua per preparazioni iniettabili q.b. 1 ml. Soluzione limpida, trasparente.

Indicazioni: VETEGLAN è una soluzione pronta di d-cloprostenolo, un analogo sintetico della PGF 2 alfa, studiato e formulato per l'uso nei bovini, cavalli e suini. La forma destrogira di cloprostenolo ha un'attività luteolitica che è circa del 350% maggiore rispetto alla forma racemica. VETEGLAN è in grado di provocare la lisi del corpo luteo ciclico, gravidico o cistico, determinando il crollo del progesterone ematico con i conseguenti eventi endocrini. VETEGLAN è indicato in bovine, cavalle e scrofe per induzione dell'estro, sincronizzazione dei calori, terapia delle cisti luteiniche o dei corpi lutei persistenti, induzione del parto, aborto precoce. Svuotamento delle raccolte purulente in utero, feto mummificato e ogni altra patologia a carico dell'apparato riproduttore che tragga giovamento dalla lisi del corpo luteo.

Controindicazioni: Non somministrare ad animali gravidi se non si vuole indurre aborto o parto. Non somministrare ad animali con ipersensibilità nota al principio attivo o ad uno degli eccipienti. Non somministrare ad animali con difficoltà respiratoria o con malattie gastrointestinali. Leggere le avvertenze.

Reazioni avverse: Nella cavalla si può osservare la comparsa di una lieve diarrea nelle 24 ore successive al trattamento. La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

Specie di destinazione: Bovine, suini (scrofe) e cavalle.

Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione: Via di somministrazione: VETEGLAN va somministrato per via intramuscolare.

Posologia:

Bovine: 2 ml capo (=150 µg di p.a.).

– Induzione dell'estro: somministrare VETEGLAN dopo aver stabilito l'esistenza di un corpo luteo funzionante (dosaggio del progesterone), generalmente tra il 6° e il 18° giorno del ciclo. Il calore appare entro le 48-60 ore successive. Se non appare alcuna manifestazione estrale, effettuare un secondo trattamento 11 giorni dopo il primo.

– Induzione del parto: somministrare VETEGLAN dopo il 270° giorno di gravidanza. Il parto dovrebbe iniziare a 30-60 ore dal trattamento.

– Sincronizzazione degli estri: sincronizzare tutte le bovine effettuando 2 iniezioni ad 11 giorni di distanza una dall'altra.

– Endometriti, piometra e feti mummificati: somministrare una dose di VETEGLAN ed attendere l'espulsione del materiale estraneo, se necessario si può ripetere il trattamento dopo 10 giorni.

– Interruzione di gravidanza: somministrare VETEGLAN entro il 4° mese di gravidanza.

– Cisti luteiniche o corpi lutei persistenti: somministrare VETEGLAN ed attendere la comparsa dei segni dell'estro.

Scrofe: 1 ml capo (= 75 µg).

– Induzione del parto: somministrare VETEGLAN dal 112° giorno di gravidanza, il 70% degli animali iniziano il parto nelle 20 ore successive.

Cavalle: 1 ml capo (= 75 µg).

– Induzione dell'estro: somministrare VETEGLAN dopo aver verificato la presenza di un corpo luteo funzionante (dosaggio del progesterone).

– Induzione del parto: somministrare VETEGLAN dopo il 320° giorno di gravidanza. Il parto inizia poche ore dopo l'iniezione.

– Sincronizzazione: somministrare VETEGLAN due volte a distanza di 14 giorni.

– Morte fetale precoce: somministrare VETEGLAN dopo aver accertato la presenza di un corpo luteo attivo (dosaggio del progesterone).

Avvertenze per una corretta somministrazione: Nessuna.

Tempi di attesa: Carne e visceri: zero giorni. Latte: zero giorni.

Particolari precauzioni per la conservazione: Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non usare dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta e sull'astuccio. Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Avvertenze speciali: Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Suini: somministrare solo quando si conosce con precisione la data di inseminazione. Il Cloproprostenolo somministrato prima del 113° giorno di gestazione può compromettere la vitalità e il peso dei suinetti. **Per l'induzione dell'aborto la somministrazione del medicinale veterinario deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.** Evitare la via endovenosa. L'utilizzo del medicinale per l'induzione del parto è indicato solo in seguito all'esclusione, mediante esame clinico ginecologico, di distocie, anomalie di posizione del feto o ostruzioni meccaniche che possano ostacolare l'espletamento del parto naturale. Per ridurre il rischio di infezioni anaerobiche, che potrebbero essere correlate alle proprietà farmacologiche delle prostaglandine, evitare l'iniezione in zone contaminate della pelle. Pulire e disinfettare il sito di iniezione a fondo prima dell'inoculazione. **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:** Il prodotto può provocare broncospasmo, non inalare e tenere lontano dalle mucose dell'operatore. In caso di contatto o autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Il prodotto non deve essere somministrato da donne in gravidanza. Le persone con nota ipersensibilità al cloprostenolo devono somministrare il medicinale veterinario con cautela. **Gravidanza e allattamento:** Non somministrare ad animali gravidi se non si vuole indurre aborto o parto. **Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:** Non somministrare con antinfiammatori non steroidei che interferiscono con il metabolismo delle prostaglandine. Non somministrare contemporaneamente ad ossitocina. **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):** Non superare le dosi consigliate. Sintomatologia da iperdosaggio si ha con la somministrazione di dosi da 50 a 100 volte superiori al consigliato. La sintomatologia è caratterizzata da broncospasmo, dispnea, diarrea e forti contrazioni uterine. **Incompatibilità:** In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato e degli eventuali rifiuti: Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Data ultima revisione del foglietto illustrativo: Maggio 2017

Altre informazioni: Confezioni: 1 Flacone da 10 ml, 1 Flacone da 20 ml, 5 flaconi da 20 ml.

Da vedersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Distribuito da:

CALIER ITALIA SRL

Via Garibaldi n° 162.

22073 Fino Mornasco (CO)

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/Barcelonès, 26 (El Ramassar)
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona) SPAGNA