

Vetecor

Ref.: 17302-001

2000 U.I./2 ml, polvere liofilizzata + solvente per soluzione iniettabile per equini, bovini, suini, ovini, caprini, cani e gatti
Vetecor, 5000 U.I./2 ml, polvere liofilizzata + solvente per soluzione iniettabile per equini, bovini, suini, ovini, caprini, cani e gatti
Gonadotropina corionica umana

INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 fiala di polvere liofilizzata contiene:

	Vetecor 2000 U.I.	Vetecor 5000 U.I.
<i>Principio attivo</i>		
Gonadotropina corionica umana	2000 U.I.	5000 U.I.
<i>Eccipienti:</i>		
Mannitolo	20 mg	20 mg

1 fiala di solvente (soluzione fisiologica iniettabile) da 2 ml contiene:

Sodio cloruro.....18 mg
Acqua per preparazioni iniettabili.....q.b.a 2 ml

INDICAZIONE(I)

Nella femmina è indicato per l'induzione dell'ovulazione nei casi d'estro prolungato o di calori silenti. In associazione con follicolo-stimolanti è indicato per l'induzione dell'estro. È utilizzato allo scopo di indurre la luteinizzazione del follicolo ed il successivo mantenimento del corpo luteo, in casi d'ipofertilità dovuta ad insufficiente funzione luteinica e nei casi di cisti ovariche più o meno associate a ninfomania.

Nel maschio è indicato nei casi d'insufficiente produzione di testosterone da parte del testicolo con conseguente diminuzione della libido e nei casi di criptorchidismo, quando sussistono i presupposti per la discesa dell'organo.

CONTROINDICAZIONI

Non somministrare ad animali affetti da disfunzioni della tiroide e della corteccia surrenale, iperprolattinemia, tumori che coinvolgono l'ipofisi o in parte l'ipotalamo.

REAZIONI AVVERSE

In alcuni rari casi si può verificare una reazione d'ipersensibilità all'hCG dopo ripetute iniezioni, con crisi di tipo allergico.

Si possono verificare ingrossamento delle ovaie e cisti ovariche.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Equini, bovini, suini, ovini, caprini, cani e gatti.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Iniezione intramuscolare o endovenosa

Cavalla: induzione dell'ovulazione nei casi d'estro prolungato: 1500-3000 U.I., ripetere eventualmente il trattamento dopo 24 h. estro, previo opportuno trattamento con follicolo-stimolanti: 2000-3000 U.I., se necessario, ripetere eventualmente il trattamento dopo 24 h.

Stallone: nei casi di criptorchidismo inguinale: 1500-5000 U.I. 2 volte a settimana per 4/6 settimane. Stimolazione della produzione di testosterone, nei casi di diminuzione della libido: 1500 U.I. 2 volte a settimana per 4/6 settimane.

Bovina: induzione dell'ovulazione nei casi di mancata o ritardata ovulazione: 1000-3000 U.I., ripetere eventualmente il trattamento dopo 24 h, se necessario.

Trattamento di cisti follicolari più o meno associate a ninfomania: 5000-10000 UI in un'unica somministrazione o in due dosi ripetute a distanza di 12/24 ore.

Ipfertilità dovuta ad insufficiente funzione luteinica: 1000-1500 U.I. nei giorni successivi alla fecondazione.

Toro: nei casi di criptorchidismo inguinale: 1500-5000 U.I., il trattamento va ripetuto 2 volte la settimana per 4/6 settimane.

Stimolazione della produzione di testosterone nei casi di diminuzione della libido: 1500 U.I., ripetere il trattamento 2 volte la settimana per 4 settimane.

Scrofa: induzione dell'ovulazione, nei casi d'anestro: 500-1000 U.I. previo trattamento di follicolo-stimolanti.

Pecora/capra: induzione dell'ovulazione, nei casi d'anestro: 100-500 U.I. previo trattamento con follicolo-stimolanti.

Verro/Ariete/Becco: stimolazione della produzione di testosterone nei casi di diminuita libido: 500 U.I., il trattamento va ripetuto 2 volte la settimana per 4/6 settimane.

Cagna: induzione dell'ovulazione nei casi d'anestro, previo trattamento con follicolo-stimolanti: 250-500 U.I. nel primo e secondo giorno d'estro.

Induzione dell'ovulazione nei casi d'estro prolungato: 250-500 U.I., ripetere eventualmente dopo 24 h.

Cane: nei casi di criptorchidismo inguinale: 100-250 U.I. Il trattamento va ripetuto 2 volte la settimana per 4/6 settimane.

Gatta: induzione dell'ovulazione: 250-500 U.I. nei primi giorni d'estro.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Mantenere la sterilità del prodotto durante la preparazione della soluzione.

Non ricostituire il prodotto con solventi diversi dalla soluzione fisiologica.

TEMPO DI ATTESA

Carne: zero giorni

Latte: zero giorni

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a 25 °C

Proteggere dalla luce

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Periodo di validità dopo ricostituzione: usare immediatamente

AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:

In caso di autoiniezione o di contatto accidentale rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Le donne in gravidanza e le persone con nota ipersensibilità alle gonadotropine devono somministrare il prodotto con cautela ed evitare contatti con il medicinale veterinario.

Gravidanza:

L'impiego non è raccomandato durante la gravidanza,

Incompatibilità:

Non miscelare con altri medicinali veterinari.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici, ma conferiti negli idonei punti di raccolta dei medicinali non utilizzati o scaduti.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO Aprile 2013

ALTRE INFORMAZIONI

Vetecor è una gonadotropina prodotta dalla placenta umana. Estratta da urina di donna gestante, viene purificata con metodi molto sofisticati, sterilizzata e liofilizzata.

La sua azione è analoga a quella dell'ormone luteinizzante in creto nell'ipofisi e pertanto nel maschio si traduce nella stimolazione delle cellule interstiziali del testicolo e nella secrezione di testosterone, mentre nella femmina nell'induzione dell'ovulazione, sequenzialmente alla maturazione del follicolo ovarico operata con follicolo-stimolanti.

Studi di farmacocinetica hanno dimostrato la metabolizzazione dell'ormone a livello epatico e la sua pressoché totale eliminazione attraverso le urine.

Confezioni:

Scatola con 3 fiale da 2000 U.I. + 3 fiale di solvente da 2 ml: A.I.C. n. 101399018.

Scatola con 2 fiale da 5000 U.I. + 2 fiale di solvente da 2 ml: A.I.C. n. 101399032

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.



Distribuito da: **Calier Italia Srl**

Via Garibaldi n°162

22073

Fino Mornasco (CO)

Telefono 331 97 44 97 8

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e
dell'autorizzazione alla produzione responsabile
del rilascio dei lotti di fabbricazione:

LABORATORIOS CALIER S.A.

C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcellona) SPAGNA.