

# Zoobiotic Globulit<sup>®</sup> 150 mg/g

## Premiscela per alimenti medicamentosi per suini Amoxicillina triidrato



25 kg

**Indicazione del principio attivo e degli altri ingredienti:** 1 g di prodotto contiene: Principio attivo: Amoxicillina (triidrato) 150 mg.  
**Indicazioni:** Prevenzione delle infezioni respiratorie indotte da Streptococcus suis. Sensibile alla amoxicillina, dopo lo svezzamento. Prima di iniziare il trattamento, accertare la presenza della malattia in allevamento.

**Controindicazioni:** Non utilizzare in caso di ipersensibilità alle penicilline o cefalosporine o ad uno degli eccipienti. Non somministrare ad animali con funzione renale gravemente compromessa, con anuria od oliguria. Non usare in presenza di batteri produttori di  $\beta$ -lattamasi. Non usare nei lagomorfi e nei roditori come conigli, cavie, criceti e gerbilli. Non usare nei ruminanti e nei cavalli.

**Reazioni avverse:** Le penicilline e le cefalosporine possono causare reazioni di ipersensibilità dopo la somministrazione. Le reazioni di ipersensibilità variano in relazione alla dose. Le reazioni allergiche (quali reazioni cutanee, shock anafilattici) possono avvenire occasionalmente e in alcuni casi potrebbero essere gravi. Se si manifestano reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il Medico Veterinario.

**Specie di destinazione:** Suini (suinetti svezzati).

**Posologia per ciascuna specie, via e modalità' di somministrazione:** Per via orale, miscelata nel mangime. Somministrare 15 mg di amoxicillina/kg di peso corporeo/giorno (equivalenti a 100 mg del medicinale/pc/giorno) per 15 giorni. A causa della forma di somministrazione e del fatto che il consumo di acqua e di mangime dipende dalla condizione clinica dell'animale, al fine di assicurare un corretto dosaggio, la concentrazione antimicrobica verrà regolata tenendo conto del consumo giornaliero di mangime e acqua. Ad esempio, la formula seguente può essere utilizzata per calcolare la dose di medicinale:

$$100 \text{ mg "Zoobiotic Globulit 150 mg/g Premiscela"} \text{ per kg peso corporeo/giorno} \times \text{Peso medio di animali da trattare (kg)} = \text{mg "Zoobiotic Globulit 150 mg/g Premiscela"} / \text{kg di mangime}$$

Consumo medio giornaliero di mangime degli animali (kg)

Il peso corporeo degli animali trattati deve essere determinato con precisione per evitare un sottodosaggio.

**Avvertenza per una corretta somministrazione:** Come standard di riferimento, la percentuale di incorporazione nel mangime deve essere stabilita in 2-3 Kg di Zoobiotic Globulit 150 mg/g premiscela per mangime medicato per suini in 5 Kg di mangime non medicato; omogeneizzare ed incorporare 7-8 Kg/Tn di mangime. La granulazione del mangime medicato deve essere effettuata ad una temperatura non superiore a 55°C.

**Tempo di attesa:** Carni e visceri: 7 giorni.

**Particolari precauzioni per la conservazione:** Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Periodo di validità dopo l'incorporazione nel mangime sfarinato e/o pellettato: 3 mesi. Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi. Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

**Avvertenze speciali:** Speciali precauzioni per ciascuna specie di destinazione: In caso di reazione allergica, il trattamento deve essere sospeso. Animali con ridotta assunzione di cibo e/o in condizioni di malessere generale devono essere trattati per via parenterale. Ove i risultati del test di sensibilità lo confermano, bisogna sempre far ricorso, come terapia di prima scelta, all'impiego di antibiotici a spettro di azione ridotto. Speciali precauzioni per l'impiego negli animali: L'uso del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità dei batteri isolati dall'animale. Se ciò non fosse possibile, la terapia deve basarsi sulle informazioni epidemiologiche locali (a livello regionale, di azienda agricola) sulla sensibilità dei batteri target. L'uso improprio del medicinale veterinario può aumentare la prevalenza di batteri resistenti alla penicillina. L'uso prolungato o ripetuto deve essere evitato migliorando le pratiche di gestione in azienda, soprattutto in materia di igiene, di ventilazione e di gestione dei suinetti, evitando condizioni di stress.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: LABORATORIOS CALIER S.A. C/Barcelonès, 26 (El Ramassar) Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spagna.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:** Le penicilline e le cefalosporine possono causare reazioni di ipersensibilità (allergia) dopo iniezione, inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Sono state osservate reazioni di ipersensibilità crociate tra penicilline e cefalosporine. Non maneggiare il prodotto in caso di allergia a penicilline e/o cefalosporine. Maneggiare il prodotto con cura per evitare l'inalazione di polvere, nonché il contatto con la pelle e gli occhi durante l'incorporazione di premiscela nel mangime, adottando precauzioni specifiche:

- Prendere le misure adeguate per evitare la dispersione della polvere durante l'incorporazione della premiscela nel mangime.
  - Indossare una maschera antipolvere (in conformità con lo Standard Europeo EN 140FFP1), guanti, indumenti da lavoro e occhiali di sicurezza omologati.
  - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Sciacquare abbondantemente con acqua in caso di esposizione
  - Non fumare, mangiare né bere durante la manipolazione del prodotto.
- Qualora dopo l'esposizione compaiano sintomi quali eruzioni cutanee, consultare un medico e mostrargli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Gonfiore del viso, delle labbra o degli occhi o difficoltà respiratorie sono sintomi più seri e richiedono un intervento medico urgente. Lavarsi le mani dopo l'utilizzo del prodotto. **Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione:** Non utilizzare contemporaneamente a neomicina, poiché blocca l'assorbimento di penicilline orali. Non utilizzare in combinazione con antibiotici, con modalità d'azione batteriostatica (quali macrolidi, sulfamidici e tetracicline), in quanto essi potrebbero entrare in competizione con l'azione battericida delle penicilline. **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):** Non sono state osservate reazioni avverse a un dosaggio fino a 5 volte superiore la dose raccomandata. In caso di gravi reazioni allergiche sospendere il trattamento e somministrare cortisonici ed adrenalina. In altri casi, applicare un trattamento sintomatico. **Incompatibilità:** In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

**Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti:** Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

**Data ultima revisione del foglietto illustrativo:** Aprile 2015

**Altre informazioni:** Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. Premiscela per alimenti medicamentosi. Considerare le linee direttrici ufficiali sull'incorporazione delle premiscele medicate negli alimenti finali destinati agli animali. SOLO PER USO VETERINARIO

A.I.C. N° 104159/013

Distribuito in Italia da: Calier Italia srl  
Via Garibaldi n° 162  
22073 Fino Mornasco (CO)

Lotto n°:

Scade il:

Ref. 300543-001