BANACEP vet 5 mg

Compresse rivestite con film per cani e gatti

Benazepril cloridrato

IT **Indicazione del principio attivo e degli altri ingredienti:** Ogni compressa divisibile contiene: Principio attivo: Benazepril ..... 4,6 mg (equivalente a 5 mg di benazepril cloridrato).

Eccipienti: Biossido di titanio (E171) 1,929 mg; Ossido di ferro giallo (E172) 0,117 mg; Ossido di ferro rosso (E172) 0,014 mg; Ossido di ferro nero (E172) 0,004 mg.

Indicazioni: Banacep vet 5 mg appartiene al gruppo di farmaci denominati inibitori degli Enzimi Convertitori dell'Angiotensina (ACE). Esso viene prescritto dal veterinario per il trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia nei cani e per la riduzione della proteinuria associata a malattia renale cronica nei gatti.

Controindicazioni: Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo benazepril cloridrato o ad uno qualsiasi degli eccipienti delle compresse. Non usare in caso di ipotensione (bassa pressione sanguigna), ipovolemia (basso volume del sangue) o insufficienza renale acuta. Non usare in caso di insufficiente gittata cardiaca causata da stenosi aortica o polmonare. Non usare in cagne o gatte gravide o in allattamento in quanto la sicurezza del benazepril cloridrato non è stata stabilita durante la gravidanza e l'allattamento in queste specie.

Reazioni avverse: Alcuni cani con insufficienza cardiaca congestizia possono presentare vomito o affaticamento durante il trattamento. Nei cani e nei gatti con malattia renale cronica si può avere un moderato aumento nel sangue del livello di creatinina, un indicatore della funzionalità renale. Ciò è dovuto probabilmente all'effetto del trattamento di riduzione della pressione sanguigna a livello renale e pertanto non è necessariamente un motivo di interruzione della terapia, a meno che l'animale non presenti altre reazioni avverse. Il prodotto può determinare un aumento di consumo di cibo e un incremento di peso nei gatti. In rare occasioni nei gatti sono stati segnalati vomito, scarso appetito, disidratazione, letargia e diarrea. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

Specie di destinazione: Cani e gatti.

Posologia per ciascuna specie, via e modalita' di somministrazione: Il prodotto va somministrato per via orale una volta al giorno, indipendentemente dall'assunzione di cibo. La durata del trattamento è illimitata. Nei cani il prodotto va somministrato per via orale alla dose minima di 0,25 mg (range 0,25-0,5) di benazepril cloridrato/kg di peso vivo una volta al giorno, secondo la seguente tabella:

Peso del cane (Kg)	BANACEP vet 5 mg compresse rivestite con film	
	Dose standard	Dose doppia
> 5 - 10	1/2 compressa	1 compressa
> 10 - 20	1 compressa	2 compresse

Nei cani con insufficienza cardiaca congestizia, la dose può essere raddoppiata, sempre mediante un'unica somministrazione giornaliera, ad una dose minima di 0,5 mg (range 0,5-1,0) di benazepril cloridrato/kg di peso vivo se giudicato necessario e consigliato dal medico veterinario. Seguire sempre le istruzioni di dosaggio indicate dal veterinario. Nei gatti il prodotto va somministrato per via orale alla dose minima di 0,5 mg (range 0,5-1,0) di benazepril cloridrato /kg di peso vivo al giorno secondo la seguente tabella:

Peso del gatto (kg)	Banacep vet 5 mg compresse rivestite con film
2,5 - 5	1/2 compressa
> 5 - 10	1 compressa

Avvertenze per una corretta somministrazione: Nessuna.

Tempo di attesa: Non pertinente.

Particolari precauzioni per la conservazione: Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Conservare in un luogo asciutto. Riporre ogni mezza compressa nel blister e utilizzare entro un giorno. La confezione in blister deve essere riposta nella scatola di cartone. Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo SCAD.

Avvertenze speciali: Avvertenze speciali per cani e gatti: L'efficacia e la sicurezza del prodotto non sono state stabilite in cani e gatti di peso inferiore a 2,5 kg di peso corporeo. **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:** In caso di malattia renale cronica, il vostro veterinario verificherà lo stato d'idratazione del vostro animale prima di iniziare la terapia, e potrebbe raccomandare di effettuare regolari esami del sangue durante la terapia per monitorare la concentrazione di creatinina plasmatica e la conta degli eritrociti. **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:** Lavare le mani dopo l'uso. In caso d'ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Le donne in gravidanza devono prestare particolare attenzione per evitare un'accidentale esposizione orale, in quanto si è rilevato che gli ACE inibitori hanno un effetto sui feti umani durante la gravidanza. **Impiego durante la gravidanza e l'allattamento:** Non usare durante la gravidanza e l'allattamento. La sicurezza del prodotto non è stata testata in cani e gatti riproduttori, gravidi o in allattamento. **Interazioni:** Informare il veterinario se l'animale sta assumendo o ha assunto recentemente altri medicinali. Nei cani con insufficienza cardiaca congestizia, il prodotto è stato somministrato in associazione con digossina, diuretici, pimobendan e prodotti anti-aritmici senza evidenziare reazioni avverse correlate. Nell'uomo, la combinazione di ACE-inibitori e FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) può causare una ridotta efficacia anti-ipertensiva o compromettere la funzionalità renale. La combinazione del prodotto con altri agenti anti-ipertensivi (ad es. sostanze che bloccano i canali del calcio, ß-bloccanti o diuretici), anestetici o sedativi, può portare ad effetti ipotensivi addizionali. Pertanto l'impiego concomitante di FANS o di altri medicinali ad effetto ipotensivo deve essere valutato accuratamente. Il vostro veterinario potrebbe raccomandare di monitorare strettamente la funzionalità renale ed i sintomi di ipotensione (letargia, debolezza ecc.) e trattarli in caso di necessità. Non si possono escludere interazioni con diuretici risparmiatori di potassio quali spironolattone, triamterene o amiloride. Il vostro veterinario potrebbe raccomandare di monitorare il livello plasmatico del potassio nel corso della terapia con il prodotto in combinazione con un diuretico a risparmio di potassio a causa del rischio di iperpotassiemia (elevato potassio nel sangue). **Sovradosaggio:** In caso di sovradosaggio accidentale, si può riscontrare un'ipotensione (bassa pressione sanguigna) transitoria reversibile. La terapia dovrebbe consistere nella somministrazione per infusione endovenosa di una soluzione salina isotonica calda.

Precauzione particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto inutilizzato o degli eventuali rifiuti: Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo: 08/2017

Altre informazioni: Il Benazepril cloridrato è un farmaco precursore idrolizzato in vivo nel suo metabolita attivo, il Benazeprilato. Il Benazeprilato è un inibitore molto potente e selettivo dell'enzima convertitore dell'angiotensina (ACE), prevenendo quindi la conversione dell'angiotensina I (inattiva) in angiotensina II (attiva) e riducendo di conseguenza la sintesi di aldosterone. Esso blocca perciò gli effetti mediati dall'angiotensina II e dall'aldosterone, inclusa la vasocostrizione sia delle arterie che delle vene, la ritenzione di sodio e d'acqua da parte del rene e rimodellandone gli effetti (inclusa l'ipertrofia cardiaca patologica e le alterazioni degenerative del rene). BANACEP vet 5 mg determina una inibizione protratta dell'attività dell'ACE plasmatico nei cani e nei gatti, con più del 95% di inibizione al culmine dell'effetto ed un'attività significativa (> 80% nei cani e >90% nei gatti) che persiste per 24 ore dopo la somministrazione. BANACEP vet 5 mg riduce la pressione sanguigna e il volume di carico del cuore in cani con insufficienza cardiaca congestizia. In gatti con insufficienza renale indotta sperimentalmente, BANACEP vet 5 mg ha normalizzato l'elevata pressione capillare glomerulare e ridotto la pressione ematica sistemica. La riduzione dell'ipertensione glomerulare può ritardare la progressione della patologia renale attraverso l'inibizione di danni ulteriori a carico dei reni. In una prova clinica in gatti con malattia renale cronica BANACEP vet 5 mg ha ridotto significativamente la perdita di proteine nelle urine (UPC); questo effetto è probabilmente mediato dalla riduzione della ipertensione glomerulare e dagli effetti positivi sulla membrana basale glomerulare. BANACEP vet 5 mg ha anche migliorato l'appetito dei gatti, soprattutto nei casi più gravi. A differenza di altri ACE-inibitori, il benazeprilato è escreto nella stessa percentuale sia per via biliare che per via urinaria nei cani e per l'85% per via biliare e per il 15% per via urinaria nei gatti e pertanto non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio di BANACEP vet 5 mg nel trattamento dei casi con insufficienza renale.

Confezioni: Scatola da 14 e 140 compresse. E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. Solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia unica.

Distribuito da: **Calier Italia Srl**
Via Garibaldi n° 162
22073 Fino Mornasco (CO)

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès, (Barcelona) Spagna

CALIER

CALIER - Artwork not approved