



# CALIMIX

Antiparasitario externo - garrapaticida e insecticida de amplio espectro

## Forma farmacéutica

Concentrado emulsionable

## Composición

Cipermetrina 10 g  
Ethion 40 g  
Excipientes y agentes emulsionantes c.s.p. 100 g



## Indicaciones\*

Calimix se utiliza en baños de inmersión y aspersión para el control de moscas, garrapatas, piojos y ácaros de la sarna en bovinos. Ectoparasiticida. Garrapaticida con prolongado poder residual (8 a 14 días), piojicida, sarnifugo y mosquicida. Insecticida con acción repelente por un período de 3 a 4 semanas.

Tratamiento y prevención de ectoparásitos garrapatas, piojos chupadores y masticadores, sarna y Mosca de los Cuernos (*Haematobia irritans*).

El espectro de acción incluye:

Acaros y Garrapatas: *Boophilus microplus* (Garrapata común del bovino), *Psoroptes spp.*, *Sarcoptes scabiei*, *Notoedres cati*.  
Moscas y tábanos: *Musca spp.*, *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos), *Callitroga hominivorax*, *Sarcophaga carnaria*, *Lucilia sericata*, *Tabanus spp.*, *Dermatobia hominis*.  
Piojos: *Damalinea Boris*, *Damalinea ovis*, *Bovicola subrostratus*, *Haematophinus eurysternus*, *Haematophinus asini*.

## Posología\*

Se utiliza como baño de inmersión o aspersión. Realizar lentamente una premezcla agregando un volumen de producto en dos volúmenes de agua agitando para homogeneizar correctamente.

En el caso de baños de inmersión:

- Pie de baño: 1 litro de CALIMIX cada 1000 litros de agua.
- Reposición: 1,5 litros de CALIMIX cada 1000 litros de agua a reponer.
- Refuerzo en seco: 0,5 litros de CALIMIX cada vez que el baño disminuya 1000 litros.

En caso de baños por aspersión:

- 1 litro de CALIMIX cada 1000 litros de agua.

Intervalo entre dosis:

Para el caso de limpieza de tropa: Aplicaciones con 6, 8 ó 10 días de intervalo.

Para erradicación de garrapatas: Bañar cada 21 días hasta la eliminación del parásito (aproximadamente 10 baños durante la temporada de garrapata de agosto a mayo).

Para realizar un control eficiente de garrapatas: Bañar cada 28 días.

Para tratamiento de sarna: Realizar 2 aplicaciones con 10 días de intervalo.

## Contraindicaciones

Calimix es un producto tóxico, clasificado dentro de la categoría III: Moderadamente Tóxico.

Puede ser fatal en caso de ser ingerido. En caso de ingestión accidental, acudir al médico con el envase.

El antídoto del Ethion es el Sulfato de Atropina.

Realizar tratamiento sintomático. No suministrar leche ni sustancias que contengan grasas pues puede favorecer la absorción. En caso de ingestión accidental del producto, realizar lavado gástrico y tratamiento sintomático.

## Tiempo de espera\*

Carne: 15 días.

Leche: 48 horas.

## Producto de origen

Uruguay

## Presentación

500 ml / 1000 ml

\* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.