



# CALIFLY POUR-ON

Mosquicida y Piojicida para Bovinos

## Forma farmacéutica

Solución Pour-On

## Composición

Ethion 15%

Cipermetrina 5%

Excipientes c.s.p. 100 %



## Indicaciones\*

CALIFLY POUR-ON es un insecticida de uso tópico pour-on que asocia la acción de un piretroide sintético (cipermetrina) con la de un organofosforados (ethion).

CALIFLY POUR-ON está indicado para el tratamiento de infestaciones de piojos, melófagos, moscas y mosquitos y en especial aquellas producidas por la "mosca de los cuernos" (*Haematobia irritans*) para la cual brinda una protección por 30 días.

## Indicaciones\*

CALIFLY POUR-ON está indicado para el tratamiento de piojos, melófagos, moscas y mosquitos. CALIFLY POUR-ON está especialmente indicado para el control de la "Mosca de los Cuernos" *Haematobia irritans*. Protección por 30 días. El producto no puede ser utilizado en predios con presencia de garrapatas.

## Posología\*

Para el control de piojos, moscas y mosquitos:

Bovinos de 50 kg: 1.25 ml

Bovinos de 100 kg: 2.5 ml

Bovinos de 200 kg: 5 ml

La dosis máxima siempre será de 10 ml por animal. En caso de altas infestaciones puede repetirse la dosificación según criterio del profesional actuante.

CALIFLY debe ser aplicado en forma tópica POUR-ON, desde la cruz hasta la grupa

## Precauciones:

Califly Plus es un producto TOXICO, clasificado dentro de la categoría II (OMS). El producto debe ser manipulado con precaución, evitando su inhalación o el contacto directo con la piel. Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación. En caso de contacto accidental lavar la piel con abundante agua y jabón, si los ojos son afectados lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir al médico con el envase original. Antídoto para el Ethion (Organofosforados): Sulfato de Atropina 1%. No eliminar los envases en cursos de agua por ser tóxico para peces, no volver a utilizar los envases vacíos.

## Tiempo de espera\*

Carne: 15 días

Leche: 2 días

## Producto de origen

Uruguay

## Presentación

250 ml / 1 L / 3 L / 5 L

\* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.