



ACTYL Pour-On

Ectoparasiticida e insecticida
pour-on de amplio espectro

FORMA FARMACÉUTICA:
Solución Pour-On

COMPOSICIÓN:
Fipronil 1 g
Excipientes c.s.p. 100 mL



INDICACIONES:

ACTYL Pour-on (Garrapaticida e Insecticida para bovinos) está indicado para el tratamiento y control de Garrapata (*Boophilus microplus*); Mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*); Miasis o Bichera (*Cochlyomyia homminivorax*); Ura o Berne (*Dermatobia hominis*). Auxilia en el control de Piojos masticadores y Piojos chupadores (*Damalinia bovis* y *Solenopotes capillatus*).

DOSIFICACIÓN:

Dosis: Aplicar 1 mL de ACTYL Pour-on cada 10 Kg de peso vivo (equivalente a 1 mg de Fipronil/Kg de peso vivo).

Dosis mínima por animal: 10 mL.

Para Erradicación de la garrapata, debe repetirse el tratamiento cada 35 días.

MODO DE APLICACIÓN:

ACTYL Pour-on es una solución de uso tópico para aplicación pour-on. Aplicar en el dorso del animal, en una franja desde la cruz hasta la base de la cola. Ver tabla de dosificación.

Tabla de dosificación

Kg p.v.	mL
50 - 200	20
200 - 300	30
300 - 400	40
400 - 500	50

LIMITACIONES DE USO:

Producto para ser utilizado exclusivamente en bovinos. No utilizar en animales menores a 10 semanas de vida. No aplicar en animales mojados. Las precipitaciones que se producen en forma inmediata a su aplicación, pueden disminuir la eficacia del producto. Evitar la sobredosificación, especialmente en animales debilitados, preñados o estresados. No aplicar en ganado lechero, cuya leche sea destinada al consumo humano. No utilizar en ganado lechero durante los últimos tres meses previos al parto. No presenta contraindicaciones en vacas preñadas.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación. No fumar ni comer mientras se manipula el producto. Evitar todo contacto con la piel, ojos o vestimenta. En caso de contacto accidental con el producto, lavar las partes expuestas con abundante agua y jabón. No volver a utilizar los envases vacíos. Eliminar los envases ya utilizados según la legislación del país, y/o enviar los envases vacíos al Centro de Acopio más cercano.

CONSERVACIÓN:

Conservar el producto en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar directa, entre 4°C y 30 °C.

ADVERTENCIA:

PRODUCTO TÓXICO: Categoría Toxicológica según OMS: II Moderadamente peligroso.

ANTIPARASITARIO



TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 50 días.

Leche: El producto no debe ser utilizado en vacunos cuya leche sea destinada al consumo humano. No utilizar en vacas lecheras durante los últimos 3 meses previos al parto.

Product de origen:

Uruguay

PRESENTACIONES:

250 mL, 1 L, 3 L y 5 L.



LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY, S.A.

Camino Carrasco 6262

CP 11500 Montevideo - Uruguay

Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127

E-mail: laboratorios@calier.com.uy

www.calier.com.uy

CALIER - All rights reserved