



FULMINANT 1%

Insecticida - Mosquicida

FORMA FARMACÉUTICA: Cebo granulado

COMPOSICIÓN:

Thiamethoxan 1 g

z-9 Tricoseno, Bitrex y otros excipientes

c.s.p. 100 g

INDICACIONES: Fulminant 1%, está indicado para combatir moscas sensibles o resistentes en todo tipo de instalaciones rurales, tambos, galpones avícolas, criaderos de cerdos, caballerizas, establos. Actúa como veneno de ingestión.

DOSIS: Utilizarlo como cebo seco, tal cual se presenta. Se deben utilizar unos 200 g de Fulminant 1% por cada 100 m² de superficie, aplicado en las áreas más frecuentadas por las moscas: pisos, pasillos, umbrales de ventanas, tablas, etc. (2g/m²). También se puede colocar en bandejas o recipientes apropiados colocados en lugares en que se agrupen las moscas.

Fulminant 1% debe reponerse cuando el cebo haya sido cubierto de polvo o moscas muertas. Colocar mas cuando el anterior haya sido consumido o lavado. Acción sobre moscas domésticas (*Musca domestica*).

PRECAUCIONES: Veneno - No ingerir.

Clase de toxicidad OMS*: U Improbable que presente peligro agudo de intoxicación en uso normal.

Fulminant 1% es de baja toxicidad. Sin embargo, deben tomarse medidas de precaución del operador para minimizar la exposición.

RECOMENDACIONES GENERALES:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No ingerir o inhalar el producto. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Usar ropa de trabajo cubriendo todo el cuerpo, incluídos brazos y piernas. Utilizar guantes protectores cuando se aplique. Lavar las partes del cuerpo expuestas al producto o bañarse y cambiarse de ropa al terminar los trabajos. Suspender las tareas inmediatamente si sufriera alguna indisposición. Respire aire fresco, lavarse y cambiarse de ropa. Llamar al médico si no desaparecen los síntomas (muestre la etiqueta al médico). Si el producto fuera ingerido, suministrar una gran cantidad de carbón activado con agua abundante y consultar al médico. No inducir el vómito.

SÍNTOMAS: Thiamethoxan tiene baja toxicidad aguda. Las intoxicaciones son solo imaginables si se ingieren grandes

cantidades. En animales de estudio, los síntomas de intoxicación fueron inespecíficos y pasajeros.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO: Grupo químico: neonicotinoide. Nombre común: Thiamethoxan.

ACCIÓN TÓXICA: Interactúa con receptores nicotínicos de acetilcolina. No es inhibidor de la colinesterasa.

ANTÍDOTO/TRATAMIENTO: No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN: En Uruguay, comunicarse con el CIAT (Centro de Intoxicación y Asesoramiento Toxicológico) Hospital de Clínicas. Tel.: 1722, Montevideo-Uruguay.

VENTA LIBRE.

SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR Y EL ALIMENTO: Retirar los alimentos no cubiertos antes de aplicar. Puede causar efectos adversos a largo plazo en los organismos acuáticos del ambiente. No arrojar el producto ya utilizado en lagunas, arroyos, etc.

Destruir los envases bajo la normativa vigente del país, o llevar los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

CONSERVACIÓN: Mantener los envases bien cerrados al abrigo el sol y la humedad en áreas bien ventiladas.

Conservar entre 4°C y 30°C.

PRESENTACIÓN:

250 y 400 g.



**LABORATORIOS CALIER
DE URUGUAY, S.A.**

Camino Carrasco 6262

CP 11500 Montevideo - Uruguay

Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127

E-mail: laboratorios@calier.com.uy

www.calier.com.uy

*Indicaciones, dosis y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.