



FORCER



Solución Pour-On

INHIBIDOR DEL DESARROLLO DE LAS GARRAPATAS DE ACCIÓN SISTÉMICA.

FORMA FARMACEÚTICA: Solución Pour-On

COMPOSICIÓN: Fluzurón 2,5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL

INDICACIONES: VENTA LIBRE. Forcer Pour-On, está indicado para el control de la garrapata *Boophilus microplus*,

Amblyomma spp., en ganado de engorde y cría. No es necesario dosificar terneros antes del destete mientras sus madres están siendo tratadas con Forcer Pour-On.

Los terneros quedarán protegidos a través de la leche materna. Protege a los animales contra la infestación de garrapatas por un período entre 8 -12 semanas.

MODO DE ACCIÓN: Fluzurón pertenece al grupo químico de las benzoilureas. Una vez aplicado al animal llega a las garrapatas a través de la sangre del huésped (acción sistémica).

En la garrapata, Fluzurón interfiere en la formación de quitina, componente principal de su exoesqueleto. Se impide así la maduración de huevos, larvas y ninfas, se interrumpe la reproducción y se corta el ciclo biológico. Forcer Pour-On no es adulticida.

INSTRUCCIONES DE USO: Debe ser administrado en dos franjas, una a cada lado de la línea media dorsal, desde la cruz hasta la grupa. No aplicar sobre animales mojados. Dos horas después de aplicado, la lluvia no afecta la eficacia del producto.

DOSIFICACIÓN: La dosis es 2,5 mg/Kg de peso vivo, lo que se consigue aplicando 5mL de producto por cada 50 Kg de peso vivo.

RECOMENDACIONES DE USO: Uso preventivo para evitar infestaciones. Donde la infestación de garrapatas es estacional, aplicar el primer tratamiento estratégico 2-4 semanas antes de la aparición habitual de garrapatas adultas sobre los animales. Uso curativo para eliminar infestaciones. Animales ya infestados quedarán libres de garrapatas adultas 2-3 semanas tras el tratamiento. Si la infestación inicial es muy elevada, se recomienda el uso previo de un garrapaticida convencional. En este caso, tras la aplicación de dicho garrapaticida, aplicar Forcer Pour-On sobre animales no mojados.

EFFECTOS COLATERALES: Forcer Pour-On aplicado según las indicaciones de la etiqueta no presenta efectos colaterales.

COMPATIBILIDAD: Forcer Pour-On es compatible con garrapaticidas, mosquicidas, antihelmínticos, vitaminas y vacunas.

PERÍODO DE ESPERA: Carne: 42 días. Leche: No dosificar animales lecheros cuya leche sea destinada al consumo humano.

PRECAUCIONES: No sacrificar para el consumo humano terneros de menos de 10 meses de edad que estén siendo amamantados por vacas tratadas.

Se puede tratar vacas preñadas, sin embargo para evitar complicaciones por stress de manejo, no tratar vacas preñadas durante las 6 semanas previas al parto.

ADVERTENCIAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. En caso de intoxicación accidental, lleve inmediatamente al paciente a un médico y proporcionele una copia de la etiqueta. No existe antídoto. El tratamiento es sintomático. El producto es irritante. Evitar el contacto con ojos y piel. Utilizar guantes durante la aplicación. Los envases utilizados deben ser destruidos según la normativa sanitaria vigente del país y/o eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA OMS: U Improbable que presente peligro agudo de intoxicación en uso normal.

CONSERVACIÓN: Mantener el producto en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, lejos de fuentes de ignición o fuego. Temperaturas entre 15 - 30° C.

PRESENTACIÓN: 250 mL, 1000 mL, 3000 mL y 5000 mL.

Dir. Téc.: Leonardo Tejera.

N° Registro M.G.A.P. (Uruguay): 2019E00715

TABLA DE DOSIFICACIÓN

Peso (Kg)	Vol. (mL)	Peso (Kg)	Vol. (mL)
51-100	10	351 - 400	40
101 - 150	15	401 - 450	45
151 - 200	20	451 - 500	50
201 - 250	25	501 - 550	55
251 - 300	30	551 - 600	60
301 - 350	35	+ 600	5mL/50Kg

IMPORTA Y DISTRIBUYE: ECUADOR: LABORATORIOS CALIER DE ECUADOR, LABCALIER S.A. Miguel H. Alcivar S/N - Torres del Norte - Piso 4 - Oficina 404 Ciudadela Kennedy Norte - Guayaquil - Ecuador. Reg. N° XXXX AGROCALIDAD. GUATEMALA: PRODUCTOS VALPARAÍSO, S.A. 2da Calle 32-77 Zona 7 Ofibodegas San Mateo N°4 Guatemala 01007. PANAMÁ: CALIER INTERNACIONAL PANAMÁ, S.A. Tel.: 507 390 4918 - Fax: 507 390 8491. PERÚ: PROMUNE SAC. Calle Los Cedros Mz. J, Lt. 3A-1, Urb. Huertos de Villena, Lurín, Lima. M.V. Celso Tirado Acosta. REPÚBLICA DOMINICANA: GRUPO INDUKERN DOMINICANA. Calle 3era. N° 89 Villa Aura, Santo Domingo Oeste.

Lote:
Fab.:
Venc.:

Elaborado por:



LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY, S.A.

Camino Carrasco 6262

CP 11500 Montevideo - Uruguay

Tel.: (598) 2606 2056 - Fax: (598) 2604 5127

laboratorios@calier.com.uy

www.calier.com.uy - calier.com