

# Zipyran Plus Sabor

Comprimidos para perros

**Composición cualitativa y cuantitativa de la sustancia activa y otras sustancias:** Cada comprimido contiene:

Prazicuantel .....	50 mg
Pirantel (embonato) .....	50 mg
Febantel .....	150 mg

**Indicaciones de uso:** Tratamiento de las principales parasitosis intestinales de perros producidas por los siguientes parásitos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia hydatigena*, *Dipylidium caninum*.

**Contraindicaciones:** No administrar a animales extremadamente debilitados.

**Reacciones adversas:** Los efectos adversos de presentación más frecuente fueron anorexia, letargo, diarrea y vómitos.

**Especies de destino:** Perros.

**Posología para cada especie, modo y vías de administración:** En general la posología es de 5 mg de Prazicuantel, 5 mg de Pirantel (embonato) y 15 mg de Febantel por Kg p.v. (equivalente a 1 comprimido/10 Kg p.v.). Dosis orientativas:

Cachorros y perros pequeños:

- 1/2 - 2 Kg p.v. : 1/4 comprimido
- 2 - 5 Kg p.v. : 1/2 comprimido
- 5 - 10 Kg p.v. : 1 comprimido

Perros medianos:

- 10 - 20 Kg p.v.: 2 comprimidos
- 20 - 30 Kg p.v.: 3 comprimidos

Perros grandes:

- 30 - 40 Kg p.v.: 4 comprimidos

No es necesario sobrepasar los 4 comprimidos en perros que pesen más de 40 Kg. Para la desparasitación rutinaria del perro es necesario un único tratamiento. Este será repetido cada tres meses como control rutinario. En zonas con alto riesgo de infestación puede administrarse una dosis repetida a los 14 días del primer tratamiento. Esta repetición de tratamiento es necesaria especialmente en zonas donde no hayan sido eliminados los huéspedes intermedios tales como pulgas, ratones etc.

**Instrucciones para una correcta administración:** No se han descrito.

**Tiempo de espera:** No procede.

**Precauciones especiales de conservación:** Mantener fuera del alcance y la vista de los niños y animales domésticos. No conservar a temperatura superior a 25°C. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la caja.

**Advertencias especiales:** Precauciones especiales para su uso en animales: Para evitar nuevas reinfestaciones, limpiar los locales y no administrar despojos descontrolados a perros. Es recomendable administrar el tratamiento inmediatamente antes de la comida. Se puede administrar directamente al animal o triturado y mezclado con el alimento. No se necesita ayuno o un régimen alimenticio específico. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: No se han descrito. Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario: Dosis superiores a 4 veces la dosis terapéutica pueden producir trastornos digestivos (náuseas, cólicos, diarreas) que deberán someterse a observación veterinaria. **Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta:** No usar durante las cuatro primeras semanas de la gestación. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No administrar con fármacos colinérgicos o con propiedades anticolinérgicas, ya que pueden potenciar su toxicidad. No administrar simultáneamente con compuestos de la piperazina.

**Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso:** Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

**Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez:** 9-04-03

**Información adicional:** Caja con 1 blister de 2 comprimidos. Caja con 1 blister de 6 comprimidos. Caja con 1 blister de 10 comprimidos. Caja con 2 blisters de 10 comprimidos. Caja con 10 blisters de 10 comprimidos. Caja con 25 blisters de 10 comprimidos. **Clase farmacológica:** Antiparasitario.

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Condiciones de dispensación: medicamento sujeto a prescripción veterinaria

Reg. nº A-2463 (Uruguay)

"Enviar los envases vacíos al Centro de Acopio más cercano"

Reg. nº 9769 (Paraguay). Reg. 1486-ESP.

Reg. nº ES4-42-10-6325 (Costa Rica)

Reg. nº ES4-41-12-6301 (Perú)

Titular de la autorización de comercialización y fabricante que libera el lote:

 **LABORATORIOS CALIER, S.A.**  
C/Barcelonès, 26 (El Ramassar)  
08520 Les Franqueses del Vallès  
(Barcelona) España

# Zipyran Plus Flavor

Tablets for dogs

**Statement of the active substances and other ingredients:** Each tablet contains:

Praziquantel .....	50 mg
Pyrantel (as pyrantel embonate) .....	50 mg
Febantel .....	150 mg

**Indications for use:** Treatment of the main intestinal parasitosis of dogs caused by the following parasites: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Tria hydatigena* and *Dipylidium caninum*.

**Contraindications:** Do not administer to extremely weak animals.

**Adverse reactions:** The most seen undesirable effects were anorexia, lethargy, diarrhoea and vomiting.

**Target species:** Dogs.

**Dosage and administration route:** The general posology is 5 mg of Praziquantel, 5 mg of Pyrantel (embonate) and 15 mg of Febantel/kg b.w. (equivalent to one tablet/10 kg b.w.). Guiding dosage:

**Puppies and small dogs:**

1/2-2 kg b.w.: 1/4 tablet

2 - 5 kg b.w.: 1/2 tablet

5 - 10 kg b.w.: 1 tablet

**Medium dogs:**

10 - 20 kg b.w.: 2 tablets

20 - 30 kg b.w.: 3 tablets

**Big dogs:**

30 - 40 kg b.w.: 4 tablets

Dogs weighing more than 40 kg should not be given more than 4 tablets. For routine disinfestation, only one treatment is needed. This will be repeated every three months as a routine control. Fourteen days after treatment, a repeated dose can be administered in high-risk areas of infestation. This repetition is necessary, especially, in those areas where intermediate hosts such as fleas and mice are present.

**Advice on correct administration:** None.

**Withdrawal period:** Not applicable.

**Storage:** Keep at temperature not exceeding 25°C. Keep out of the reach and sight children. Do not use after the expiry date stated on the box.

**Special warnings: Special precautions for use in animals:** To avoid new re-infestations, buildings should be thoroughly cleaned. Do not administer non-controlled offal to dogs. It is advisable to administer the treatment just before feeding. It can be administered directly to the animal or ground and mixed with the feed. Neither fasting nor any other specific is required.

**Special precautions to be taken by the person administering the veterinary medicinal product to animals:** None. **Overdose (symptoms, emergency procedures, antidotes):** Doses 4 times over the therapeutic dose may cause digestive disorders (nausea, colic and diarrhoea), which must be submitted to veterinary advice. **Use during pregnancy, lactation or lay:** Do not use during the first four weeks of the pregnancy. **Interaction with other medicinal products and other forms of interaction:** Do not administer with cholinergic drugs or with anticholinergic properties, because they can enhance its toxicity. Do not administer simultaneously with compounds of the piperazine.

**Special precautions for the disposal of unused veterinary medicinal product or waste materials, if any:** Any unused veterinary medicinal products or waste material derived from such veterinary medicinal product should be disposed of in accordance with local requirements.

**Date on which the package leaflet was last approved:** 09-04-03

**Other information:** Box with a two-tablets blister. Box with a six-tablets blister. Box with a ten-tablets blister. Box with two blisters of 10 tablets, Box with 10 blisters of 10 tablets. Box of 25 blisters of 10 tablets.

For veterinary use –To be supplied only on veterinary prescription–.

VDCA. Nº: 244.5.15 (Sri Lanka)



LABORATORIOS CALIER, S.A.  
C/Barcelonès, 26 (El Ramassar)  
08520 Les Franqueses del Vallès  
(Barcelona) Spain