

Roxacin

Solución oral

Enrofloxacin



1L

Composición: Cada ml contiene:
Principio activo: Enrofloxacin.....100 mg
Excipientes: Alcohol bencílico.....7,80 mg
Edetato de disódio.....10,0 mg
Otros excipientes, c.s.p.....1ml

Indicaciones de uso: **Aves (pollos de engorde):** CRD, colibaciosis, cólera, coriza, salmonelosis. El uso de quinolonas reduce la eliminación de las *Salmonellas* y la mortalidad, pero la erradicación de *Salmonellas* y *Mycoplasmas* no puede garantizarse únicamente por la terapia con quinolonas. Antes de su aplicación terapéutica deberá comprobarse la sensibilidad del microorganismo causante por medio de un antibiograma. Las quinolonas deberían administrarse después de asegurar el diagnóstico bacteriológico y cuando existieran resistencias a otros antibióticos.

Especies de destino: Aves (pollos de engorde).

Posología, modo y vía de administración: Solución oral. Preparar la solución en el momento de uso. **Aves (pollos de engorde):** 10 mg de enrofloxacin/ Kg p.v./día (equivalente a 1 ml de ROXACIN por litro de agua de bebida); durante 2-3 días, en caso de salmonelosis podrá prolongarse el tratamiento hasta 5 días. Debido a la forma de administración oral, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

Contraindicaciones: No deben tratarse animales con trastornos del crecimiento cartilaginosos.

Reacciones adversas: Debido a la conocida acción lesiva de las fluoroquinolonas en las articulaciones, especialmente en animales jóvenes, debe controlarse la posibilidad de ingesta aumentada de agua de bebida durante largo tiempo, y por ello de sustancia activa, bajo condiciones especiales de temperatura o manejo.

Interacciones: No aplicar simultáneamente con antiinflamatorios no esteroideos (pueden producirse convulsiones). Por vía oral, la administración simultánea de sustancias que contengan magnesio, calcio y aluminio puede reducir la absorción de enrofloxacin. Pueden aparecer interacciones a nivel hepático con otros fármacos de eliminación hepática.

Sobredosificación: la dosis máxima tolerable es dos veces la dosis terapéutica. Puede manifestarse intolerancia gástrica (vómitos y anorexia) y ligero incremento de la motilidad espontánea, que cede al suspender el tratamiento. Riesgo de fotosensibilización y erupciones alérgicas, acompañadas de artralgias. Suprimir la medicación y aplicar tratamiento sintomático.

Lote:

Cad.:

Titular y fabricante:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonès 26 (El Ramassar) - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) España

Precauciones especiales de uso en animales: Preparar la solución en el momento de uso. Renovar el agua medicada diariamente. Cuando se use este producto se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso de antimicrobianos. El uso de fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido pobremente, o se espera que respondan pobremente, a otras clases de antimicrobianos. Siempre que sea posible las fluoroquinolonas deben ser usadas después de realizar un test de sensibilidad. El uso del producto en condiciones distintas a las recomendadas en dicha etiqueta puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a las fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otras quinolonas debido a las resistencias cruzadas. Si no existe mejora en los tres días siguientes de iniciada la terapia puede estar indicado un cambio en la terapia escogida.

Precauciones específicas de seguridad que deberá tomar la persona que administre o manipule el medicamento: No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las fluoroquinolonas. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto. Si aparecen síntomas tras exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar dichas advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente.

Incompatibilidades: Con soluciones ácidas pues el principio activo puede precipitar.

Advertencias especiales para cada especie de destino: No está permitido su uso en aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.

Tiempo de espera: Carne: 5 días. Huevos: No está permitido su uso en aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.

Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el medicamento no utilizado y/o los envases: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes. No requiere condiciones especiales de conservación. Mantener fuera del alcance y a la vista de los niños. Una vez abierto el envase uso inmediato.

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria -

Importado y distribuido por:

LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY, S.A.

Dr. Leonardo Tejera

Reg. n.º A-3035 (Uruguay)



Ref. 301496-002

C
CALIER