

Inmodulen

Suspensión Inyectable

Especialidad inmunológica de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Células inactivadas de <i>Propionibacterium granulosum</i>	25mg
Lipopolisacárido proveniente de células de <i>E. coli</i>	2 mg
Excipiente, c.s.p.	100 ml

INDICACIONES:

Bioestimulante de la inmunidad inespecífica, mejorador del estado clínico de las enfermedades infecciosas.

ESPECIES DE DESTINO: Porcino y bovino.

DOSIS, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Preventivo: Administrar intramuscularmente a razón de 0,5 - 1 ml/10 kg de peso vivo, pudiéndose repetir a las 48 horas.

CONTRAINDICACIONES: No administrar conjuntamente con inmunodepresores.

EFFECTOS INDESEABLES, FRECUENCIA Y GRAVEDAD: No se han descrito.

SOBREDOSIS:

Ensayos realizados con concentraciones 50 veces superiores a la dosis terapéutica, no han evidenciado fenómenos de toxicidad local y/o general en las dos especies de destino.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Agitar antes de usar.

TIEMPO DE ESPERA: No precisa

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: Mantener entre 2 y 8°C, y al abrigo de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Reg. n° VE2010034064 (El Salvador)

Reg. n° 4H-11252-AGROCALIDAD (Ecuador)

Reg. n° PF-2632 (Honduras)

Reg. n° RF-846-09 (Panamá)

Reg. n° 5.514 (Paraguay)

Reg. n° SENASA N° B.05.4.07.1.0002 (Perú)

Reg. n° 3.048 (Rep.Dominicana)

Reg. n° A-2836 (Uruguay)

Reg. n° MAT-SASA-MI 5.868 (Venezuela)

Dir. Téc.: Carlos Bravo

Reg. n° SENASAG PUV-F 006798/15 (Bolivia)

Reg. n° SAGARPA N° B-7965-076 (Mexico)

Reg. SENASA n° 04-070 (Argentina)

Reg. n° ES-196-63-01-1169 (Guatemala)

Reg. n° TACB/BIOLOGIC/968/13 (Malasia)



LABORATORIOS CALIER, S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona) España

Tel.: (+34) 93 849 51 33 - Fax: (+34) 93 840 13 98

E-mail: laboratorios@calier.es - Web: <http://www.calier.es>

Corresp.: Apartado 150 - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) España

Inmodulen

Injectable suspension

Immunological speciality for veterinary use

COMPOSITION:

Inactivated cells of <i>Propionibacterium granulosum</i>	25 mg
Lipopolysaccharide from <i>E. coli</i> cells	2 mg
Excipient q.s.	100 ml

INDICATIONS:

Unspecific immunity biostimulant, clinical condition improver in infectious diseases.

TARGET ANIMALS: Bovine and Porcine.

DOSAGE AND ADMINISTRATION ROUTE:

Prevention: administer intramuscularly 0.5-1 ml/10 kg of b.w. Dosage can be repeated after 48 hours.

CONTRAINDICATIONS: Do not administer with immunosuppressors.

SIDE EFFECTS, FREQUENCY AND SERIOUSNESS: Have not been described.

OVERDOSE:

Tests performed in concentration 50 times higher than the therapeutic dose have not evidenced local and/or general toxicity.

SPECIAL WARNINGS FOR ITS USE: Shake before use.

WITHDRAWAL PERIOD: Not required.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR STORAGE: Store between 2 and 8°C and away from sunlight.

Keep out of the reach of children.

