



EQ-ZONA

Antiinflamatorio no esteroide (AINE)

Forma farmacéutica

Granulado oral

Composición

Cantidad por sobre 5 g:

Fenilbutazona 1 g

Colorante naranja A-1 (E-110) 2 mg



Indicaciones*

Procesos inflamatorios de los équidos, excepto los que cursan con lesiones de la mucosa intestinal. Inflamaciones agudas localizadas del aparato locomotor, como Artritis, Tendinitis, Miositis, Sinovitis, Infosura, etc. Traumatismos en general. Tratamientos post-quirúrgicos de todo tipo como suturas de heridas cutáneas, cirugía del aparato locomotor. Cirugía abdominal, etc. (no interfiere en el proceso de cicatrización). Dolor en general, ya sea causante de cojera o de cualquier otra claudicación funcional.

Posología*

El granulado se debe administrar siempre mezclado con la ración diaria, bajo la pauta posológica siguiente:

Día 1: 4,4 mg/kg cada 12 horas.

Día 2 - 5: 2,2 mg/kg cada 12 horas.

Día 6 en adelante: 2,2 mg/kg cada 24 horas.

Esta posología equivale para un caballo adulto de un peso aproximado de 500 kg a:

Día 1: 2 sobres cada 12 horas.

Día 2 - 5: 1 sobre cada 12 horas.

Día 6 en adelante: 1 sobre cada 24 horas.

Es imprescindible que el caballo disponga siempre de agua o bebida en abundancia.

Contraindicaciones

Lesiones degenerativas de la mucosa intestinal. Deshidratación. Insuficiencia renal. Insuficiencia hepática.

Tiempo de espera*

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

Propiedades farmacológicas

La fenilbutazona es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) clásico. Está químicamente relacionado con aminopirina y antipirina y poseen un mecanismo de acción común. Produce un bloqueo del sistema enzimático de la ciclo oxigenasa de manera, probablemente, irreversible. Este hecho le confiere carácter antiinflamatorio in vivo.

Producto de origen

España

Presentación

16 sobres de 5 g / 100 sobres de 5 g

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.